

S P I S Y  
VYDÁVANÉ  
PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTOU  
MASARYKOVY UNIVERSITY  
REDAKTOR

BOHUSLAV HOSTINSKÝ

PUBLICATIONS  
DE LA  
FACULTÉ DES SCIENCES  
DE L'UNIVERSITÉ MASARYK  
RÉDIGÉES PAR

Rok 1929

Čís. 111


# ITER TURCICO-PERSICUM

PARS V.

## PLANTARUM COLLECTARUM ENUMERATIO (GRAMINEAE-CRYPTOGAMEAE)

SCRIPSIT

DR. FR. NÁBĚLEK



VYCHÁZÍ S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY

VLASTNÍM NÁKLADEM VYDÁVÁ

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

BRNO, KOUNICOVA 63

NA SKLADĚ MÁ

EN VENTE CHEZ

KNIHKUPECTVÍ A. PÍŠA, BRNO, ČESKÁ 28

YERGEN WOLFF  
HARVARD UNIVERSITY

S P I S Y  
VYDÁVANÉ  
PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTOU  
MASARYKOVY UNIVERSITY  
REDAKTOR

PUBLICATIONS  
DE LA  
FACULTÉ DES SCIENCES  
DE L'UNIVERSITÉ MASARYK  
RÉDIGÉES PAR

BOHUSLAV HOSTINSKÝ

Rok 1929

Čís. 111

# ITER TURCICO-PERSICUM

PARS V.

## PLANTARUM COLLECTARUM ENUMERATIO (GRAMINEAE-CRYPTOGRAMAE)

SCRIPSIT

DR. FR. NÁBĚLEK

VYCHÁZÍ S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY

VLASTNÍM NÁKLADEM VYDÁVÁ

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

BRNO, KOUNICOVA 63

NA SKLADĚ MÁ

EN VENTE CHEZ

KNIHKUPECTVÍ A. PÍŠA, BRNO, ŮESKÁ 28



ITER TURCICO-PERSICUM.  
PLANTARUM COLLECTARUM ENUMERATIO.

PARS V.

[Pars I.: harum Publicationum No. 35, pars II. No. 52, pars III. No. 70, pars IV. No. 105.]

**Gramineae.**

**Panicum** Teneriffae (L.) R. Br. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, in rupestribus aridissimis alt. ca. -250 *m.* 14. IV. 1909 (No. 3134). Moab: Hammâm ez-Zerka (Kallirrhoë) ad latus orient. Maris Mortui dit. Mâdaba: in aridissimis alt. ca. -200 *m.* 27. VI. 1909 (No. 3186).

*P. turgidum* Forsk. Arabia Petraea: Rôr el-Mezra'a in peninsula Maris Mortui El-Lisân, in aridissimis alt. ca. -350 *m.* 14. VI. 1909 (No. 3187).

**Digitaria** sanguinalis (L.) Scop. (= *Panicum sanguinale* L.) Armenia Turcica: oppidum Malatia, in horto alt. ca. 1100 *m.* 6. X. 1910 (No. 3407).

**Echinochloa** Crus galli (L.) R. et Sch. (= *P. Crus galli* L.) Kurdistan. Turc. distr. Ramorân, ad orientem ab oppido S'ert: in agris irrigatis ad pagum Tell Mišâr, alt. ca. 750 *m.* 18. VII. 1910 (No. 3340).

*E. colonum* (L.) P. B. Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 3283).

**Setaria** viridis (L.) P. B. Kurdistan. Turc. distr. Hakkîari (Taurus Armenus): in agris in valle torrentis Howaraš inter Baškala et Kočânes, alt. ca. 1900 *m.* 30. VIII. 1910 (No. 3414); agri ad pagum Chôšab (Mahmudije) inter Wan et Baškala, alt. ca. 1850 *m.* 7. IX. 1910 (No. 3424).

**Pennisetum** ciliare (L.) Link. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, ad rupes aridas alt. ca. -200 *m.* Forma *humilis foliis et vaginis densiuscule et longe pilosis*. 30. III. 1909 (No. 3144). Arabia Petraea: Seil-ed-Drâ dit. El-Kerak, inter rupes calcar. alt. ca. 0 *m.* Forma *elata, usque 60 cm alta, foliis glabris, vaginis parce pilosis, ore ciliatis (rhachide aspera)* 15. VI. 1909 (No. 3183).

*P. orientale* Rich. Kurdistan. Turc. (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 700 *m.* 10. VI. 1910 (No. 3362 et 3397).

*P. asperifolium* (Desf.) Kthe. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, inter rupes calc. alt. ca. -150 et -200 *m.* 30. III. 1909 (No. 3201); ad coenobium Mâr Sâba inter Bethlehem et Mare Mortuum, inter rupes alt. ca. 0 *m.* 25. V. 1909 (No. 3127); Galilaea: 'Ain Tabra (el-Tabîra) prope Tiberiadem, in fissuris rupium calcar. alt. ca. -200 *m.* 22. IV. 1909 (No. 3131).



**Imperata** cylindrica (L.) P. B. Mesopotamia: oppidum 'Amâra ad Tigridem, ad fossas irrigationis. 30. III. 1910 (No. 3298). Persia austro-occidentalis (Susiana): in desertis ad ruinas Susorum, 15. III. 1910 (No. 3242 et 3246).

**Saccharum** Aegyptiacum Willd. Syria: ad pagum Brumâna supra opidum Beirût, ad aquas alt. ca. 700 *m.* X. 1909 (No. 3199).

S. Sara Rozb. cum praecedente. X. 1909 (No. 3200).

**Erianthus** Hostii Griseb. [= *E. strictus* (Host.) Bl. et Fgh.] Syria litoralis: Antelias prope Beirût, ad rivum Nahr-el-Kelb frequens. Kurdist. Turc. distr. Berwari: ad pagum Šêch Mâma dit. Amadia, ad rivum alt. ca. 800 *m.* 22. VI. 1910 (No. 3328).

*E. Ravennae* (L.) P. B. Persia austro-occidentalis (Susiana): ad rivos inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran); inter Dizfûl et ruinas Susorum ad ripas rivorum et ad fossas irrigationis copiosus. 14. III. 1910 (No. 3250) Armenia Turcica: in valle fluv. Erkenek-Su inter Malatia et Mar'aş alt. ca. 850 *m.* 11. X. 1910 (No. 3383).

**Spodiopogon** pogonanthus Boiss. Kurdist. Turc. distr. Ramorân: ad radices meridionales montium Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in fruticetis alt. ca. 1300 *m.* 24. VII. 1910 (No. 3338).

**Chrysopogon** Gryllus (L.) Trin. Kurdist. Turc. distr. Šerizor: ad pagum Dêr Harîr inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in steppa inter frutices quercuum alt. ca. 650 *m.* 20. V. 1910 (No. 3280); ad pagum Kân-i-Watman eiusdem dit., alt. ca. 950 *m.* 24. V. 1910 (No. 3276).

**Sorghum** Halepense (L.) Pers. Mesopotamia: Kâsar Naķib prope Bardâd, in horto ad fossas irrigationis. 27. IV. 1910 (No. 3240a). Kurdist. Turc. distr. Šerizor: ad pagum Dêr Harîr inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in agris alt. ca. 650 *m.* 21. V. 1910 (No. 3280). Môşul: ad ripam Tigridis, alt. ca. 250 *m.* 30. V. 1910 (No. 3240).

*S. cernuum* (Ard.) Host. Cultivatum in Palaestina, Syria, Arabia Petraea, Mesopotamia, Kurdistania usque ad regionem silvaticam, Armenia, in varietatibus nonnullis, glumis plus minus dense hirsutis, colore pallide flavido-virentibus aut castaneo-purpureis. Arabia Petraea: El-Mezra'a in peninsula Maris Mortui El-Lisân, alt. ca. -350 *m.*, forma *glumis flavido-virentibus, densissime subsericeo-hirsutis* 15. VI. 1909 (No. 3191). Armenia Turcica: ad pagum Kermechdi inter oppida Malatia et Mar'aş, alt. ca. 1000 *m.* 9. X. 1910, forma *glumis ad dorsum tandem glabrescentibus, nitentibus, flavis* (No. 3381) aut *castaneo-purpureis* (No. 3382).

**Anthistiria** ciliata L. var. *Syriaca* Boiss. [= *Themeda* Forskalii Hackel]. Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirût, in steppis alt. 600—700 *m.* 15. X. 1909 (No. 3198).

**Andropogon** Ischaemum L. Kurdist. Turc. distr. Ramorân: ad pagum Hadide ad orientem ab oppido S'ert, in steppa alt. ca. 600 *m.* 17. VII. 1910 (No. 3415). Kurdist. distr. Hakkiari: Ğelo-Dar dit. Ğula-

merik, ad tentoria aestiva Djezrâ, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 2500 m. 4. IX. 1910 (No. 3333).

*A. annulatus* Forsk. Judaea: Wâdi el-Kelt inter Hierosolyma et Jericho, ad rupes calcar. alt. ca. 0 m. 29. III. 1909 (No. 3229). Mesopotamia: ad oppidum 'Amâra ad Tigridem, ad fossas irrigationis. 30. III. 1910 (No. 3302); inter Museijib et Kerbela dit. Bar'âd, ad fossas irrig. 14. IV. 1910 (No. 3270).

*A. hirtus* L. var. *genuinus* Hackel (= var. *pubescens* Boiss.) Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, ad declivit. aridissimas alt. ca. -150 m. 30. III. 1909 (No. 3230); Bêt Ġemâl dit. Hierosolymorum, ad rupes alt. ca. 600 m. 6. IV. 1909 (No. 3229 a). Kurdistan. Turc. distr. Šerizor: ad pagum Baba Ġiġik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in steppa alt. ca. 750 m. 20. V. 1910 (No. 3230 a).

*A. hirtus* L. var. *nova glaucus* Nábělek (Tab. II., fig. 2.\*). *Densissime caespitosus. Culmi usque 40 cm alti, flavi, nitidi, basi vaginis infimis albidis, lamina carentibus, et vaginis foliorum interiorum basi dilatatis et incrassatis subcarinatis compressis arcte cincti et fere bulbos compressos formantes. Vaginae striatae, glaberrimae, glaucae. Ligulae elongatae, usque 3 mm longae, superiores parcae, inferiores densius pilosae, pilis 3—5 mm longis. Folia carinata, in margine scabridula glauca, abbreviata, 5—15 cm longa, ca. 2 mm lata. Glumellae arista ca. 3.5 cm longa.*

Differt a typo praesertim glaucescentia, caespitibus densioribus, culmis basi subbulbosis, foliis et culmis abbreviatis, arista brevior.

Habitat in Judaea ad coenobium Mâr Sâba inter Bethlehem et Mare Mortuum, ad rupes calc. alt. ca. 0 m. Legi 25. V. 1909 (No. 3132).

*A. laniger* Desf. Kurdistan. Turc. Mesopotamiae contermina: Ġebel Kumataš (Hamrîn) inter Bardâd et Hanikîn, in steppis in deserta transeuntibus alt. ca. 150 m. 3. V. 1910 (No. 3297). Kurdistan. Persica: ad Ķasr-i-Širîn dit. Hanikîn, in steppa alt. ca. 200 m. 7. V. 1910 (No. 3356).

*A. distachyus* L. [= *Pollinia distachya* (L.) Spr.] Judaea: Ġebel Telilija dit. Hierosolymorum, in steppa alt. ca. 750 m. 26. III. 1909 (No. 3145).

*Oryza* sativa L. In Kurdistaniae vallibus undique culta usque ad alt. ca. 1750 m. (Hašitha.) In valle fluv. Zab. dit. Kočânes alt. ca. 1200 m. 5. IX. 1910 (No. 3334).

*Phalaris* minor Retz. Mesopotamia: inter segetes ad Babylonem. 18. IV. 1910 (No. 3304).

*Ph. paradoxa* L. Kurdistan. Turc. distr. Šerizor: ad pagum Baba Ġiġik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, ad viam loco subhumido alt. ca. 700 m. 20. V. 1910 (No. 3366 a).

*Ph. nodosa* L. Moab: inter segetes ad oppidum Mâdaba alt. ca. 900 m. 30. VI. 1909. (No. 3148). Kurdistan. Turc.: ad pagum Chandûk

\* Tabularum partis IV. praecedentis (harum publ. No. 105).

inter Hassan Kef ad Tigridem et S'ert, in agris incultis alt. ca. 300 *m.* 11. VII. 1910 (No. 3366).

**Cornucopiae** cucullatum L. Mesopotamia: Môşul, ad limum in ripa Tigridis alt. ca. 250 *m.* 30. V. 1910 (No. 3238).

**Phleum** tenue Schrad. Galilaea: 'Ain Tabra (et-Tabira) ad Tiberiadem, alt. ca. -200 *m.* 22. IV. 1909 (No. 3129).

Ph. Graecum Boiss. et Heldr. Kurdist. Turc. distr. Şerizor: in glarea rivi Nahr Astêre prope pagum Dêr Harîr inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, alt. ca. 600 *m.* 26. V. 1910 No. 3291). Assyria: ad pagum Mâr Jakub prope pagum Simel dit. Môşul, in steppa alt. ca. 700 *m.* 8. VI. 1910 (No. 3400).

Ph. echinatum Host. Kurdist. Turc. distr. Şerizor: Handrian-(Hândarin-)Daş supra pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbela), alt. ca. 900 *m.* 23. V. 1910 (No. 3346).

**Alopecurus** myosuroides Hds. [= *A. agrestis* L.] Galilaea: 'Ain Tine et 'Ain Tabra ad Tiberiadem, ad fontes alt. ca. -200 *m.* 22. et 24. IV. 1909 (No. 3128). Persia austro-occidentalis (Susiana): in margine paludis ad ruinas Susorum. 16. III. 1910 (No. 3251).

*A. arundinaceus* Poir. Kurdist. Turc. distr. Hakkîari: traiectus Chômar inter pagos Haşîtha et Şattak, in pascuis alt. ca. 2300 *m.* 30. VII. 1910 (No. 3325).

**Aristida** Adscensionis L. var. caeruleascens Hackel [= *A. coerulescens* Desf.] Judaea: ad coenobium Mâr Sâba dit. Bethlehem, inter rupes in steppa. 25. V. 1909 (No. 3126); 'Ain Ğidi (Engaddi) ad litus occident. Maris Mortui, in aridissimis alt. ca. -250 *m.* 26. V. 1909 (No. 3182). Persia austro-occidentalis (Susiana): Siah-Kuh (Puşt-i-Kuh) ad Deilerûn (Deh-i-Loran), in steppis. 25. III. 1910 (No. 3404).

*A. ciliata* Desf. Arabia Petraea: Wâdi Mûsa (Petra), in steppa. 19. VI. 1909 (No. 3218).

*A. plumosa* L. Kurdist. Turc.: Ğebel Kumataş (Ğ. Hamrîn) inter Bakûba et Hanikin, in steppa alt. ca. 120—150 *m* forma *aristae seta media a basi plumosa, glumis subaequalibus*. 3. V. 1910 (No. 3296); Kurdist. Persica: ad Kâsr-i-Şîrîn dit. Hanikin, in steppa alt. ca. 400 *m.* 7. V. 1910 (No. 3352).

*A. caloptila* (Jaub. et Sp.) Boiss. Arabia Petraea: Wâdi Mûsa (Petra), in steppa inter rupes. 19. VI. 1909 (No. 3138).

**Stipa** parviflora Desf. Moab: Rabba (Rabbath Ammon) inter Mâdaba et El-Kerak, in steppa alt. ca. 900 *m.* 25. VI. 1909 (No. 3216). Arabia Petraea: Wâdi Bseira inter Et-Tafile et Eş-Şôbak, in steppa alt. ca. 550 *m.* 17. VI. 1909 (No. 3179).

*S. tortilis* Desf. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho in semi-deserto, alt. ca. -250 *m.* 30. III. 1909 (No. 3227). Galilaea: rupes supra Tiberiadem alt. ca. -180 *m.* 21. IV. 1909 (No. 3172). Arabia Petraea: Wâdi el-Hsâ inter El-Kerak et Et-Tafile, in aridissimis alt. ca. 400 *m.*



16. VI. 1909 (No. 3215). Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppis et semidesertis inter Šuštar, Dizfûl et ruinas Susorum et imprimis inter Susa et Deilerûn (Deh-i-Loran) copiosissima. 15. III. 1910 (No. 3247 et 3266); inter Deilerûn et fluv. Tib, in semidesertis ad radices montium Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh), 26. III. 1910 (No. 3222); in collibus Kuh Beijât (Ğebel Hamrîn) inter Deilerûn et oppidum Amâra ad Tigridem in deserto argiloso praesertim in convallibus specim. plerumque aprica nana. 26. III. 1910 (No. 3419 et 3420). In steppis et semidesertis inter Bardâd et Hanikîn copiosissima.

*S. barbata* Desf. Moab: Wâdi Môğib (Arnon) inter Mâdaba et El-Kerak, in steppa alt. ca. 500 *m.* 12. VI. 1909 (No. 3231). Kurdist. Turc.: Ğebel Kumataš (Ğ. Hamrîn) inter Bağûba et Hanikîn, in steppa alt. ca. 150 *m.* 3. V. 1910 (No. 3296). Kurdist. distr. Šerizor, in steppis ad pagum Baba Ğiğik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, alt. ca. 650 *m.* Kurdist. distr. Hakkari: in valle Châne inter pagos Amadia et Hašitha, alt. ca. 1100 *m.* 21. VI. 1910 (No. 3358).

*S. aristella* L. Palaestina: mons Karmel, ad El-Muchraka, inter rupes alt. ca. 500 *m.* 2. V. 1909 (No. 3176). Kurdistania Turcica: ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, in steppa inter rupes alt. ca. 500 *m.* 8. VI. 1910 (No. 3399).

*Oryzopsis* miliacea Asch. et Schwf. [= *Piptatherum* miliaceum (L.) Coss.] Palaestina orientalis: Wâdi Ğeria dit. 'Ammân (Rabbath Ammon), ad 'Ain Šunei, inter frutices alt. ca. 550 *m.* 15. IV. 1909 (No. 3173); Moab: Wâdi el-Hsâ inter Mâdaba et El-Kerak, ad rivulum alt. ca. 300 *m.* 17. VI. 1909 (No. 3189); Wâdi Môğib (Arnon) inter Mâdaba et El-Kerak, alt. ca. 350 *m.* 25. VI. 1909 (No. 3232).

*O. holciformis* (M. B.) Hackel [= *P. holciforme* R. et Sch.] Palaestina: Ğebel Mâr Elias (Karmel), El-Muchraka, inter frutices alt. ca. 500 *m.* 2. V. 1909 (No. 3175); planities Esdreton, ad Tell el-Mutesr selim (Megiddo) dit. Ğenîn, in graminosis humidis. 6. V. 1909 (No. 3154a)-Kurdist. Turc. distr. Hakkari: mons Maidanoke supra pagum Hašitha dit. Ğulamerik, ad fossas nivales alt. ca. 1850 *m.* 20. VI. 1910 (No. 3364); vallis Châne inter pagos Hašitha et Amadia, in humosis subhumidis alt. ca. 1500 *m.* 21. VI. 1910 (No. 3357).

*O. molinioides* (Boiss.) Hackel [= *P. molinioides* Boiss.] Kurdist. Turc. distr. Hakkari: Ğelo-Dağ dit. Ğulamerik, tentoria aestiva Djezra, ad rupes calcar. nigras alt. ca. 2900 *m.* 3. IX. 1910 (No. 3411).

*Milium* vernale M. B. var. montanum Cosson. Kurdist. Pers.: ad pagum Režâb dit. Kaşr-i-Širîn (Hanikîn) in humosis in quercetis alt. ca. 1200 *m.* 5. V. 1910 (No. 3349).

*Agrostis* verticillata Vill. Arabia Petraea: ad fontem Ğerba inter oppida Ma'an et Šôbak, 21. VI. 1909 (No. 3197). Kurdist. Turc. (Assyria): ad Altunköpri inter Kerkuk et Erbil (Arbela), ad fossas irrigationis alt. ca. 280 *m.* 17. V. 1910 (No. 3197a).

*A. alba* L. var. *scabriglumis* Boiss. Kurdist. Turc. distr. Berwari: ad pagum Mongeš in valle Sapna dit. Amadia, in steppa in declivit. aridis alt. ca. 800 *m*. Forma *viridis*. 23. VI. 1910 (No. 3254). Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, in declivitat. aridis ad monasterium Werin-Warak alt. ca. 2200 *m*. Forma *purpurascens*. 23. VIII. 1910 (No. 3321).

**Polypogon** Monspeliense (L.) Desf. Judaea: Bêt Ğemâl dit. Hierosolymorum, ad fossas alt. ca. 450 *m*. 7. IV. 1909 (No. 3220); Wâdi el-Kelt prope Jericho, in declivit. aridis alt. ca. -200 *m* (forma aprica nana), 30. III. 1909 (No. 3208); ad 'Ain Duk dit. Jericho, ad rivulum alt. ca. -250 *m*. 31. III. 1909 (No. 3224). Galilaea: planities Esdreton, in paludibus ad Tell-el-Muteselim (Megiddo) dit. Ğenîn, 5. V. 1909 (Nr. 3153). Persia austro-occidentalis (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum, 16. III. 1910 (No. 3249). Mesopotamia: ad fossas inter Musejib et Kerbela, 14. IV. 1910 (No. 3259). Kurdist. Turc. distr. Šerizor: ad pagum Baba Ğiğik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, ad fossas alt. ca. 680 *m*. 20. V. 1910 (No. 3339a). Inter pagos Tell Kef (Tell-is-Kof) et Maltai dit. Mûşul, ad fossas alt. ca. 350 *m*. 6. VI. 1910 (No. 3339).

**Calamagrotis** Persica (Boiss.) Stapf [= *C. litorea* (Schrad) DC. var. *Persica* Boiss. cf. Handel-Mazzetti, Pteridophyta u. Anthoph. aus Mesopotam... I. c. pag. 28]. Mesopotamia: in silvulis salicum et Populi Euphratici in ripis Tigridis ad Mûşul alt. ca. 250 *m* frequens. 30. V. 1910 (No. 3239).

*C. epigeios* (L.) Roth. Kurdist. Turc. distr. Hakkari: traiectus Ćhômâr inter pagos Hašitha et Šattak, in humosis ad declivit. septentrionem spectantes alt. ca. 2300 *m*. 30. VII. 1910 (No. 3324). Taurus Armenus: Warak-Dar prope Wan, in humosis ad monasterium Werin-Warak alt. ca. 2300 *m*. 23. VIII. 1910 (No. 3320).

**Pentatherum** Nábëlek genus novum [= *Calamagrostis* Adans. p. p.] [Tab. I., fig. 3; pag. 9., fig. 1.] Tribus Agrostideae. *Spiculae omnes uniflorae, a latere paulum compressae, paniculatae. Glumae subaequales, carinatae, muticae, sub floris articulationem persistentes, rhachilla supra glumas articulata, callosa, ultra florem non producta, undique longe et aequaliter pilosa. Glumella glumis brevior, hyalina, longe pilosa, 4-nervis, nervis omnibus in aristas 4 breves productis, praeterea arista dorsali infra medium inserta, e spicula exserta, instructa. Palea glumella subbrevior, bicarinata. Stamina 3 antheris brevibus; stigmata sessilia, plumosa. Caryopsis ovalis, profunde sulcata.* Genus *Pentatherum* m. in tribu Agrostidearum generi *Calamagrostis* proximum, a quo imprimis propter glumellae nervos in aristulas 4 productos disiungendum esse videtur. Habitu etiam Agrosti simili *Calamagrostibus* alienum. Si tamen cum *Calamagrostibus* coniungendum, sectionem earum *Pentatherum* sectioni *Deyeuxia* comparandam formans.



**Pentatherum Olympicum** (Boiss.) Nábělek [= *Calamagrostis Olympica* Boiss.] *Perenne, dense caespitosum. E rhizomate non repente surculos foliosos steriles et culmos fertiles numerosos edens. Surculi et culmi basi vaginis aphyllis, hyalinis, vetustis griseo-brunescentibus, integris, glaberrimis, obtecti et ideo paulum bulbosi. Folia surculorum sterilium omnia et culmorum fertilium basalia tenera, linearia, acuminata, subcanaliculata, una cum vaginis glabra, viridia, erecta. Folia culmea latiora, plana, 5—7-nervia, glabra, in margine scabridula. Ligula ca. 1.5 mm longa, bifida, in lobos obtusos divisa, et antice praeterea dentes duo triangulari-lanceolatos, acutos, formans. Culmi erecti, glaberrimi. Panícula laxa, angusta, post anthesin contracta, ramis semiverticillatis, erecto-*




Fig. 1.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

*Pentatherum Olympicum* (Boiss.) Nk. 1-flos, 2 palea, 3 glumella, 4 glumae, 5 anthera, 6 caryopsis, 7 ligula. 1—3 ca.  $\frac{15}{1}$ , 4 ca.  $\frac{20}{1}$ , 6 ca.  $\frac{16}{1}$ , 6 ca.  $\frac{16}{1}$ , 7 ca.  $\frac{6}{1}$ .

*patulis, inaequilongis, tenuibus, flexuosis, 2—5-floris, et pedicellis scabris formata. Glumae subaequales, caeruleo-violaceae, carinatae, anguste ovatae, acutae, in margine brevissime, ad carinas longius denticulato-scabrae, glabrae, muticae, ca. 2 mm longae. Rhachilla infra glumellam callosa, longe albido-pilosa, pilis glumella subbrevioribus, undique conformibus. Glumella omnis longe pilosa, hyalina, late obovata, ca. 1.75 mm longa, apice truncata, 4-nervis, nervis in aristulas duo laterales longiores, duo interiores breviores, scabras, productis quadriseta, dorso arista infra medium oriente, paulum flexuosa, non geniculata, glumellae longitudinem ca. duplo superante, scabra, e glumis ca. 1 mm exserta, instructa. Palea glumella late involuta, obtusa, bicarinata. Caryopsis ca. 1 mm longa, flava.*

Adsunt varietates duo: var. **Boissieri** m. [*Pentatherum Olympicum* (Boiss.) Nk. var. **Boissieri** Nk., = *Calamagrostis Olympica* Boiss. var. **Boissieri** Nk.] *foliis latioribus, minus teneribus, culmis*

*altioribus et crassioribus, usque ca. 30 cm altis* [specimina Caucasica, Lazica etc.], et var. **nivale** m. [Pentath. *Olympicum* (Boiss.) Nk. var. *nivale* Nk., = *Calamagr. Olym.* Boiss. var. *nivalis* Nk.], *foliis tenerioribus, anguste linearibus (basalibus ca. 1.5 mm latis et usque 4 cm longis, culmeis ca. 2 mm latis et 2.5 cm longis), culmis humilibus, absque panicula 5—8 cm altis, paniculis ca. 2—3 cm longis*. [Specimina Kotschyana ex monte Kuh Daëna, No. 738, specim. Bornmülleriana ex monte Elburs, alt. 2700—2800 m, Iter Persicum alterum No. 8363, etc.]

Specimina a me in Tauro Armeno (in Kurdist. Turc. distr. Hakkari), in monte Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, ad nives tabescentes alt. ca. 2700 m collecta (31. VIII. 1910, No. 3412), etiam huius varietatis *nivalis* sunt.

**Ammophila arenaria** (L.) Link. Syria: Haifa, in sabulosis ad litus. 1. V. 1909 (No. 3157).

**Trisetum rigidum** M. B. Kurdist. Turc. distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ġezîret-ibn-Ômar, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 2200—2300 m. 25. VII. 1910 (No. 3423); Kurdist. distr. Hakkari (Taurus Armenus): mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in pascuis alt. ca. 2700 m. 31. VIII. 1910 (No. 3331).

**Avena sterilis** L. Judaea: Wâdi el-Kelt inter Hierosolyma et Jericho, alt. ca. -150 m. 30. III. 1909 (No. 3203). Kurdist. Turc. distr. Berwari: ad pagum Šêch Mâma prope Amadia, in vineis alt. ca. 900 m. 23. VI. 1910 (No. 3329).

*A. barbata* Brot. Judaea: Hierosolyma, in hortis et vineis alt. ca. 700 m. 12. IV. 1909 (No. 3136). Arabia Petraea: Wâdi el-Hsâ inter El-Kerak et Et-Tafile, alt. ca. 350 m. 16. VI. 1909 (No. 3214).

*A. Wiestii* Steud. var. nova **glabra** m. *Glumae ca. 18 mm longae, 7-nerviae. Glumella supra medium nec non fere usque ad apicem barbata, absque aristis 10—12 mm longa, aristis 5—7 mm longis terminata, calli cicatrice ovato-oblonga, arista ca. 3 cm longa. Tota planta glabra nec non patule pilosa*. Persia austro-occidentalis (Susiana): in steppa ad fluv. Ćekâb inter ruinas Susorum et Deilerân (Deh-i-Loran). 24. III. 1910 (No. 3300).

*A. fatua* L. Persia austro-occid. (Susiana): in paludibus ad ruinas Susorum, in elevationibus inter *Juncum acutum*. 16. III. 1910 (No. 3248). Kurdist. Turc. distr. Hakkari (Taurus Armenus): mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in humosis subhumidis alt. ca. 2330 m. 31. VIII. 1910 (No. 3316).

**Arrhenatherum Kotschyi** Boiss. Kurdist. Turc. distr. Berwari: ad pagum 'Ain Nâne inter pagos Amadia et Hašitha, in quercetis alt. ca. 1200 m. 16. VI. 1910 (No. 3370).

**Anatherum** \* Nâbélek genus novum. [Tab. I., fig. 1.; pag. 11., fig. 2.]

---

\* 'Aθῆρ = arista.



Tribus Aveneae. *Spiculae* teretiuseculae, 4-florae, floribus tribus inferioribus hermaphroditis, flore summo masculo. *Glumae* membranaceae, concavae, flore breviores, inaequales, uninerves, ovato-oblongae, obtusae, muticae. *Glumellae* 5-nerves, nervo medio lateralibus brevioribus, apicem non attingentibus, validiore subcarinatae, oblongae, acutae, apice denticulatae, omnes muticae. *Palea* bicarinata, ad carinas ciliato-setulosa, inter carinas acuminata, apice denticulata. *Stamina* tria antheris brevibus. *Stigmata* bina, plumosa, ad ovarii apicem barbatam sessilia, ex flore supra basin lateraliter emergentia. *Caryopsis* ignota.

Habitu *Arrhenathero* B. Beauv. proximum esse videtur, a quo imprimis spiculis quadrifloris nec bifloris, inferioribus hermaphroditis, summo masculo et omnibus muticis differt.




Fig. 2.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

*Anatherum tauricolum* Nk. 1 Spicula (ca.  $2\frac{5}{4}$ ), 2 glumae (ca.  $\frac{2}{1}$ ), 3 glumae apex, 4 glumella (ca.  $\frac{2}{1}$ ), 5 glumellae apex, 6 palea (ca.  $\frac{2}{1}$ ), 7 paleae apex, 8 ovarium. 9 paniculae pars inferior (ca.  $\frac{1}{2}$ ).

***Anatherum tauricolum*** Nábělek sp. nova. Perenne, caespitosum, e rhizomate horizontaliter breviter repente culmos fertiles et steriles, basi *Arrhenatheri* elatii (L.) M. et K.  $\beta$  bulbosi Koch modo tuberoso-incrassatos (= internodiis abbreviatis incrassatis) et vaginis dilatatis vestitis edente. Vaginae inferiores pallidae, pilis simplicibus, fragilibus, adpressis, cito caducis, ca. 2—2.5 mm longis, densis sericeo-hirsutae, cito glabrescentes et tum nitidae, vetustae in fibras parallelas  $\pm$  solutae. Vaginae superiores virides, glabrae, leves. Folia basalia et culmorum sterilium omnia recta, rigida, longissime acuminata, acuta, primum convoluta, tum apice excepta plana, nervis compluribus, in utraque facie prominulis, supra plus, infra minus scabridulis percursa, in margine scabra, usque 40 cm longa. Folia culmea superiora valde abbreviata, 3—2 cm longa. Ligula brevis, lacerata. Culmi floriferi elati, basi breviter geniculati, recti, firmi, omnino leves, absque panicula ca. 60 cm alti. Paniculae

ca. 12—14 cm longae, erectae, apice subnutantes, contractae; ramī geminati, inaequales, tenues, asperi, infimi ca. 3 et 6 cm longi, 4—5 et 7—8 spiculās gerentes, brevior a basi spiculatus, longior ca. a medio spiculas portans, infra medium nudus. Rami raro basi iterum ramulos singulos edentes, superiores abbreviati. Spiculae erectae, geminatae, altera longius, altera brevius pedicellatae, pedicellis uno 2—3 mm, altero 4—6 mm longo, terminalis solitaria, 4-florae, flore summo masculo, ceteris hermaphroditis. Rhachilla fragillima, hispida. Glumae inaequales pallidae, membranaceae, glaberrimae, nitidae, inferior ca. 6, superior ca. 7 mm longa, late ovato-oblongae, obtusissimae aut subtruncatae, apice denticulatae, muticae, nervo unico centrali, apicem non attingente, glumae inferioris omnino levi, superioris denticulis paucis scabrido percursae. Glumella ca. 10 mm longa, pallide straminea, dorso brevissime, adpresse parce pilosa, oblonga, vix carinata, acutiuscula, apice irregulariter denticulata, 5-nervis, nervo centrali validiore et scabridulo unico apicem attingenti et hic in mucronulum brevissimum excurrenti, nervis lateralibus tenuioribus, brevioribus, apicem non attingentibus, scabridulis, florum omnium mutica. Palea ca. 8 mm longa, bicarinata, inter carinas nervis ciliato-setulosis formatae apice breviter acuminata irregulariter denticulata. Stamina tria filamentis longis, antheris brevibus, ca. 1.25 mm longis. Ovarium obovatum, apice barbatum, stigmata plumosa, in ovarii apice sessilia.

Si hoc genus novum Arrhenatheri modo Avenae uti subgenus adnumerandum sit, nomen

**Avena anathera** Nk. propono.

Habitat in Tauro Armeno, in Kurdist. Turc. districtu Hakkari, in graminosis ad apicem montis Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in humosis alt. ca. 2600 m. Legi 31. VIII. 1910 (No. 3377).

**Cynodon Dactylon** (L.) Pers. Judaea: 'Ain Duk prope Jericho, alt. ca. -250 m. 31. III. 1909 (No. 3223). Arabia Petraea: El-Mezra'a in peninsula Maris Mortui El-Lisân, alt. ca. -350 m. 15. VI. 1909 (No. 3190a); Seil ed Drâ dit. El-Kerak, alt. ca. 0 m. 15. VI. 1909 (No. 3190); Wâdi el-Hsâ inter El-Kerak et Et-Tafile, alt. ca. 300 m. 16. VI. 1909 (No. 3213). Mesopotamia: inter oppida Museijib et Kerbela, ad fossas. 14. IV. 1910 (No. 3269).

**Tetrapogon villosus** Desf. [pag. 13. fig. 3.]. Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, inter rupes calc. alt. ca. -200 m. 30. III. 1909 (No. 3228). Arabia Petraea: Ġebel Hârûn (Hor) supra Wâdi Mûsa (Petra), ad rupes arenaceas alt. ca. 900 m. 19. VI. 1909 (No. 888).

**Pappophorum Persicum** Boiss. [= P. Aucheri Jaub. et Sp.] Judaea: Wâdi el-Kelt prope Jericho, in rupestribus alt. ca. -200 m. 30. III. 1909 (No. 3226). Kurdist. Turc.: Ġebel Kumataş (Hamrîn) prope pagum Širabân inter Bardâd et Hanikîn, in steppa alt. ca. 150 m. 3. V. 1910 (No. 3285).

**Boissiera bromoides** Hochst. Kurdist. Turc. distr. Šerizor: Handrian-(Händarin-) Daṛ prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), in graminosis aridis alt. ca. 1200 *m.* 23. V. 1910 (No. 3385).

**Phragmites communis** Trin. Taurus Armenus: Warak-Daṛ prope Wan, ad rivum prope monasterium Werin-Warak alt. ca. 2200 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 3318). Armenia Turc.: ad rivum Gök-Su prope pagum Surgi inter Malatia et Marfaş, alt. ca. 900 *m.* 10. X. 1910 (No. 3384). In Mesopotamia ad Babylonem, ad Ğezîret ibn-Ômar.

*Ph. communis* Trin. var. *stenophyllus* Boiss. Galilaea: 'Ain Tine prope Tiberiadem, ad fontes alt. ca. -200 *m.* 22. IV. 1909 (No. 3140). Palaestina Orientalis: undique ad rivos inv. allibus (Wâdi): Wâdi es-Sîr, W. Araba; in vallibus Moabiticis et Arabiae Petraeae: Wâdi Môğib



Fig. 3.

Del. Dr. Fr. Nábelek.

**Tetrapogon villosus** Desf. 1 spicula, 2, 4 flosculus basalis, 3 flosculi superiores, 5 glumella flosculi tabescentis, 6 anthera, 7 caryopsis. 1 ca.  $\frac{5}{1}$ , 2—5 ca.  $\frac{10}{1}$ , 7 ca.  $\frac{15}{1}$ .

(Arnon), W. el-Hsâ, W. Kerak, El-Mezra'a in peninsula Maris Mortui El-Lisân, Wâdi Mûsa (Petra).

**Lamarekia aurea** (L.) Mœnch. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, in apricis alt. ca. -700 *m.* 24. III. 1909 (No. 3159); Judaea: in aridissimis alt. ca. -250 *m.* 19. III. 1909 (No. 3167). Persia australis: ad pagum 'Ali Čengi dit. Buşîr (Abu Šehr), in sabulosis aridis. 15. II. 1910 (No. 3293).

**Cynosurus callitrichus** W. Barbey. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma; in apricis alt. ca. 700 *m.* 24. III. 1909 (No. 3209); ad Latrûn dit. Hierosolymorum, alt. ca. 300 *m.* 3. IV. 1909 (No. 3158).

*C. elegans* Desf. Palaestina orient. (Ammon): ad pagum 'Ammân (Rabbath Ammon), in graminosis subhumidis alt. ca. 800 *m.* 16. IV. 1909 (No. 3160).



**Koeleria phleoides** (Vill.) Pers. var. *typica* Domin [Monogr. d. Gattung Koeleria, Bibliotheca Botanica XIV. pag. 257] Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, in apricis alt. ca. 700 m. 24. III. 1909 (No. 3211 et 3222); ad Jericho alt. ca. -250 m, 19. III. 1909 (No. 3168). Mesopotamia: inter Museijib et Kerbela, in semidesertis limosis. 19. IV. 1910 (No. 3272). Persia austro-occid. (Susiana): ad ruinas Susorum, inter frutices Prosopidis Stephanianae, 16. III. 1910 (No. 3252).

**Koeleria phleoides** (Vill.) Pers. var. nova **thrichantha** Nábělek. [Tab. IV., fig. 3\* ; pag. 14., fig. 4.]. *Humilis, culmis paucis aut plerumque singulis, panícula excepta ca. 5—6 cm, robustissimis usque 8 cm, minimis nanis apricis etiam tantum 2.5 cm altis, simplicibus, glabris, usque supra medium foliatis. Vaginae infimae parce pilosae, superiores glabrae, ore pilosae. Folia infima angusta, culmea superiora multo latiora, ca. 2 mm lata (ad specim. robusta usque 4 mm lata), e basi dilatata culmum oblique amplexentem longe acuminata, infima parce pilosa, cetera glabra. Ligula*




Fig. 4.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

*Koeleria phleoides* (Vill.) Pers. var. **thrichantha** Nk. 1 Spicula, 2 palea, 3 gluma, 4 glumella.

usque ca. 1.25 mm longa, hyalina, lacerosa. Panícula cylindrica aut ovato-cylindrica, densa, sublobata, plerumque ca. 3 cm longa et 1 cm lata (ad specim. robusta usque 4 cm longa et 1.5 cm lata). Spiculæ brevissime pedunculatae usque fere sessiles, ca. 6 mm longae, plerumque 4-florae, flore supremo sterili, diminuto; glumae inaequales, glumellis breviores, inferior angustior, ca. 2.5 mm longa, uninervis, ad nervum parce longe pilosa, in margine hyalina minute, crebre denticulata, ca. 3 mm longa et fere 2 mm lata, acuminata, acuta, dorso viridis, late hyalino-marginata, trinervis, nervo centrali valido, apicem attingenti, in mucronem brevissimum producto, prorsus aculeato et hic illic pilo solitario longo vestito, nervis lateralibus apicem non attingentibus. Rhachis hirsuta. Glumella ca. 4 mm longa, arista recta, ca. 0.5 mm sub apice bifida oriente, ca. 2 mm longa terminata, longe et patule piloso-hirsuta (pilis usque 1.5 mm longis), hyalino-marginata, nervis lateralibus vix prominulis. Palea glumella brevior, ca. 3 mm longa, apice biaristulata, basi pilosa, hyalina. Flosculus terminalis sterilis diminutus, pilosus, brevissime aristulatus.

\* Tabularum partis IV. praecedentis (harum publ. No. 105).




A. var. *typica* Domin (in Monogr. d. Gattung Koeleria, l. c. pag. 257) differt praeter glumellas longe patentim piloso-hirsutas spiculis longioribus et vaginis fere omnino glabris. A var. *macrantha* et *brachystachya* spiculis 6 mm et ultra longis praeditis differt a priore statura humili, paniculis elongatis nec triangulari-ovatis, spiculis plerumque 4-floris nec multifloris, longe hirsutis nec saepius glabris, a posteriore praeter culmos breves glumellis hirsutis nec glabris.

Crescit in Persia austro-occid. (Susiana): in steppis ad terram sabulosam ad fluv. Čekâb inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), 24. III. 1910 (No. 3241) et in monticulis Kuh Beijât (Gebel Hamrîn) inter Deilerûn et oppidum Amara ad Tigridem, 27. III. 1910 (No. 3305).

K. *berythaea* Boiss. et Bal. ad var. *bisetam* (Steudel) Domin [Monogr. d. Gattung Koeleria pag. 271] vergens. Forma *aprica*, *nana*, culmis simplicibus, 3—8 cm altis, paniculis 1—2 cm longis, ca. 7 mm latis, densis aut depauperatis, glumellis villosulis aut glabris, tuberculatis, prominule nervosis, interdum violaceo-suffusis, paleis biaristulatis glumellis sublongioribus aut eis aequilongis. Persia austro-occid. (Susiana): in deserto limoso subsalso ad ruinas Susorum, 16. III. 1910 (No. 3245a); ad Deilerûn (Deh-i-Loran), in semideserto ad radices montium Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh). 25. III. 1910 (No. 3267).

**Koeleria Domini** Nábělek sp. nova. [Tab. III., fig. 2.; pag. 15., fig. 5]. — Subgenus *Airochloa* Link, sectio *Bulbosae* subsectio 3. *Reticulatae* (Domin: Monogr. d. Gattung Koeleria, pag. 49). *Laxe caespitosa, rhizomatibus breviter repentibus, culmis basi vaginis pallidis, nitidis, cito in rete sat regulare, filamentosum, fatiscantibus, bulbum cylindricum ca. 2 cm longum et ca. 4 mm crassum formantibus, involucratiss, e basi geniculato-ascendenti erectis, absque panicula ca. 20—30 cm altis, firmis, teretibus substriatis, omnino glaberrimis, levibus, superne ca. a medio nudis, foliis pallide viridibus, una cum vaginis glaberrimis, omnino (etiam in margine) levibus, anguste linearibus, 2—2.5 mm latis, plurinerviis, nervis in utraque facie sed subius magis prominentibus, anguste albide calloso-marginatis superioribus valde abbreviatis, lamina usque 5 mm tantum longa. Ligula usque 3 mm longa, ovata, breviter acuminata, apice sublacerata. Panicula oblongo-cylindrica, laxa, lobata,*



Del. Dr. Fr. Nábělek.

Fig. 5.  
Koeleria Domini Nk.  $\frac{1}{1.5}$ .

basi interrupta, 5—7 cm longa, pallida aut levissime colorata, ramis tenuibus, vix scabridulis florendi tempore subpatentibus, infimis usque 12 mm longis, interdum iterum breviter ramosis, spiculas 2—3 gerentibus; superioribus abbreviatis. Spiculis inaequaliter pedunculatis, altera fere sessili, altera pedunculo 2—5 mm longo suffulta, pallidis vel levissime violaceo-virescentibus, plerumque bifloris, ca. 6 mm longis. Glumis inaequalibus, flore brevioribus, exteriori 3·8—4 mm, interiori ca. 4·5 mm longa, late obovatis, obtusissimis aut oblique subtruncatis, inaequilateribus, latissime hyalino-marginatis, tantum ad nervum centralem unicum apicem non attingentem anguste viridibus, glaberrimis. Glumella ca. 5·5—6 mm longa, obovato-linearis, acutiuscula, omnino mutica, nervo medio longissimo, ceteris brevioribus, nullo apicem attingenti, pallide-violaceo-virescenti, ad nervos patule hirsuta, ceterum glabra. Palea ca. 4—4·5 mm longa, ad nervos hirsuta, apice tridentata.



Fig. 6.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

Koeleria Domini Nk. 1 Paniculae ramus, 2 spicula, 3, 4 glumae, 5 glumella, 6 palea.  
1—4 ca.  $2\frac{15}{16}$  l., 5, 6 ca.  $\frac{3}{16}$  l.

Vaginis demum reticulatim fatiscentibus in sectione Reticulatae collocanda, sed ab omnibus Koeleriae vallesianae (All.) Bertol. formis imprimis glumis obtusissimis, usque subtruncatis, late obovatis, latissime hyalino-marginatis, nervo unico apicem non attingenti numquam mucronatis, quam flores manifeste brevioribus, differt. Ceterum pallide viridis nec glauca, panicula laxa, basi interrupta, nec densa, ligula longior. Sed propter innovationum defectum imperfecte nota. A. Koeleria castellana Boiss. et Reut. Hispanica tota tomentellohirtella longius distat. Crescit in Tauro Armeno (in Kurdist. Turc. distr. Hakkiari) in monte Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in pascuis alpinis alt. ca. 2700 m. Legi 30. VIII. 1910 (No. 3317).

K. caucasica (Trin. nom. nudum) Domin [Monog. d. Gattung Koeleria p. 161] Kurdist. Turc. distr. Hakkiari (Taurus Armenus): mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in lapidosis alt. ca. 2600 m. 30. VIII. 1910 (No. 3367).

**Sphenopus** *divaricatus* (Gouan) Rehb. Persia austro-occid. (Susiana): planities subsalsa inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et fluv. Tib. 27. III. 1910 (No. 3268). Kurdistan. Turc. (Assyria): inter Kerkuk et Altunköpri, ad terram nudam, alt. ca. 280 m. 17. V. 1910 (No. 3235).

**Catabrosa** *aquatica* (L.) P. B. Kurdistan. Persica: ad pagum Sar-i-Pûl dit. Kasr-i-Şirîn (Hanikîn), in pratis humidis et in aqua, alt. ca. 500 m. 6. V. 1910 (No. 3295).

**Eragrostis** *minor* Host. (= *E. poeoides* P. B.) Armenia Turc.: in glareis rivi Gök-Su ad pagum Surgi inter oppida Malatia et Mar'as, alt. ca. 900 m. 10. X. 1910 (No. 3380).

*E. maior* Host. (= *E. megastachya* Link) Judaea: 'Ain Ğidi (Engaddi) ad litus occident. Maris Mortui, ad rivum alt. ca. -300 m. 16. V. 1909 (No. 3188).

*E. pilosa* (L.) P. B. Mesopotamia: Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 3284).

*E. cynosuroides* (R. et S.) Del. El-Rôr dit. Jericho, alt. ca. -350 m. 15. IV. 1909 (No. 3142). Mesopotamia: Babylon, praesertim ad fossas irrigationis. 18. IV. 1910 (No. 3258).

**Melica** *minuta* L. (= *M. ramosa* Vill. var. *parviflora* Boiss.) Arabia Petraea: Wâdi Mûsa (Petra), in fissuris rupium arenac. 19. VI. 1909 (No. 3137).

*M. inaequiglumis* Boiss. [= *M. Cupani* Guss. var. *inaequiglumis* Boiss.] Kurdistan. Turc. distr. Hakkîari: ad pagum Hoz inter pagos Haşîtha et Şattak, inter rupes calcar. alt. ca. 1900 m. 28. VII. 1910 (No. 3374).

*M. Jacquemontii* Decaisn. [= *M. Cupani* var. *breviflora* Boiss.]. Kurdistan. Turc. distr. Hakkîari: mons Dwîle supra pagum Haşîtha dit. Ğulamerik, in lapidosis alt. ca. 1700 m. 18. VI. 1910 (No. 3395); mons Sîares eiusdem ditionis alt. ca. 1650 m, 19. VI. 1910 (No. 3405); Ğelo-Dar dit. Ğulamerik, in fissuris rupium calcar. nigrarum ad tentoria aestiva Djezra, alt. ca. 2900 m. 3. IX. 1910 (No. 3330).

*M. eligulata* Boiss. (= *M. Cupani* var. *eligulata*) Kurdistan. Turc. distr. Şerizor: inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğîĝik dit. Erbil (Arbela)-Rewandûz, inter rupes calcar. in steppa alt. ca. 700 m. 20. V. 1910 (No. 3292).

**Briza** *minor* L. Phoenicia: ad Sidonem (Saida), in sabulosis et lapidosis alt. ca. 10 m. 28. IV. 1909 (No. 3156). Kurdistan. Turc. distr. Şerizor: ad pagum Baba Ğîĝik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in steppa alt. ca. 650 m. 20. V. 1910 (No. 3290).

*B. spicata* Sibth. et Sm. Kurdistan. Turc. distr. Şerizor: ad pagum Kân-i-Watman inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in steppa alt. ca. 900 m. 21. V. 1910 (No. 3391).

*B. maxima* L. Judaea: in steppa ad pagum Abu Rôş dit. Hierosolymorum, alt. ca. 500 m. 2. IV. 1909 (No. 3174); ad pagum Latrûn



dit. Hierosolymorum, alt. ca. 300 m. Palaestina bor.: ad pagum Bânias (Caesarea Philippi), ad radices montis Hermonis, in lapidosis alt. ca. 600 m. 26. IV. 1909 (No. 3146). Phoenicia: in lapidosis ad oppidum Saida (Sidon) alt. ca. 10 m. 28. IV. 1909 (No. 3155).

**Aeluropus litoralis** (Gou.) Parl. Judaea: El-Rôr dit. Jericho, ad terram nudam aridissimam alt. ca. -350 m. 10. VI. 1909 (No. 3180); Moab: Hammâm ez-Zerka (Kallirrhoë) dit. Mâdaba, ad litus orient. Maris Mortui, alt. ca. -250 m. 27. VI. 1909 (No. 3185).

*A. e. repens* (Desf.) Parl. Mesopotamia: ad solum subsalsum in semi-desertis et desertis. Ad oppidum Hît ad Euphraten, ad fontes sulfur. 16. XII. 1909 (No. 3253). Inter Museijib et Kerbela, 14. IV. 1910 (No. 3260); Babylon, leg. Dr. Reuter (No. 3282). Kurdistan. Persica: ad oppidum Kasri-Širîn dit. Hanikîn, ad terram nudam sabulosam alt. ca. 400 m. 7. V. 1910 (No. 3355).

**Aeluropus mesopotamicus** Nábèlek sp. nova. [Tab. V.] *Perennis, totus molliter cinereo-pubescentis, stolonibus subterraneis repens. Stolones e basi vaginis abbreviatis, congestis bulbosa, pallide straminea, molliter hirsuta orientes, griseo-brunnei, adpresse et breviter albido-tomentosi, internodiis abbreviatis plerumque vaginis aphyllis pallide stramineis, molliter subpatule hirtis, omnino obtecti, apice culmos steriles aut fertiles ascendentes, et surculos steriles, repentes, non radicales, edentes. Culmi ramosi, crassi, internodiis valde abbreviatis vaginis striatis, adpressiuscule cinereo-hirsutis, imbricatis, omnino obtecti. Folia disticha, griseo-viridia, ad culmorum basin longissima, ca. 2 cm longa, sursum cito abbreviata, 5–7 mm, triangulari-ovata, e basi ca. 2–3 mm lata acuminata, crebre plerumque nervosa, nervis (ca. 15) plus prominentibus, mucronulo crassiusculo, brevissimo, non pungenti terminata, infima plana, cetera canaliculato-plicata sed non convoluta, angulo recto patentia aut reflexa, subpatentim hirsuta et praeterea ad nervos et ad marginem setulis crebris, brevissimis scabra. Folia surculorum abbreviata, 3–5 mm longa, canaliculato-plicata, angulo recto patentia. Culmorum rami fertiles breves, ca. 2 cm alti, ascendentes, tota longitudine foliati. Panícula compacta, globosa aut ovato-globosa. Spiculae densissimae, distichae, ca. 6 mm longae et 3 mm latae, arcuatim sursum curvatae, valde hirsutae, multiflorae, floribus imbricatis. Glumae ovatae, acutiusculae, flosculo breviores, hirsutae; glumellae densissime patentim hirsutae et praeterea tuberculatae, late ovatae, ca. 2.25 mm longae et 1 mm latae, acutae, breviter mucronulatae, 9-nerves, nervis crassis, prominentibus, scabris. Paleae glumellae aequilonga, lineari-oblonga, apice late truncata, hirsuta, ad carinas aculeato-scabra.*

Crescit in Mesopotamia, ad oppidum Hît, in limo sabuloso ad ripam Euphratis. Legi 16. XII. 1909 (No. 3194).

**Dactylis glomerata** L. Kurdistan. Turc. distr. Şerizor: Handrian-Dar supra pagum Rewandûz dit. Erbil (Arbela) in humosis alt. ca. 1200 m. 23. V. 1910 (No. 3386). Kurdistan. distr. Hakkîari: in valle Châne inter



pagos Amadia et Hašitha, in humosis subhumidis alt. ca. 1100 *m.* 21. VI. 1910 (No. 3359).

*D. glomerata* L. var. *Hispanica* Boiss. Kurdistan. Turc. distr. Berwari: in valle Sapna inter pagos Zacho (Azach) et Amadia, in humosis ad pagum Aradên alt. ca. 1400 *m.* 15. VI. 1910 (No. 3402); Kurdistan. distr. Ramorân: mons Mirgamira ad pagum Šernach, ad orientem ab oppido S'ert, in graminosis inter frutices alt. ca. 1500 *m.* 24. VII. 1910 (No. 3313 a).

**Schismus** *Arabicus* Nees. In steppis et semidesertis Judaicis, Moabiticis, Arabiae Petraeae frequens. Ad Jericho 19. III. 1909 (No. 3170); ad Ma'ân 20. VI. 1909 (No. 3150). Frequens in steppis, semidesertis et desertis Mesopotamiae, Persiae australis et austro-occidentalis, et Kurdistan. Turc. (Assyriae). Persia austr.: ad pagum 'Ali Čengi dit. Bušîr (Abu Šehr), 15. II. 1910 (No. 3294); ad pagum Hawîze ad radices montium Kuh Chormûğ eiusdem ditionis, 18. II. 1910 (No. 3255). Persia austro-occid. (Susiana): ad ruinas Susorum, in alveolis subumbrosis et sub fruticibus Zizyphi Nummulariae, forma umbrosa, laxa, 16. III. 1910 (No. 3243). Kurdistan. Turc. (Assyriae): ad pagum Tuz Chormati inter Kerkuk et Erbil (Arbela), in tectis domus, 12. V. 1910 (No. 3311).

*S. calycinus* (L.) Coss. Mesopotamia: Mōšul, ad ripam sabulosam Tigridis alt. ca. 250 *m.* 3. VI. 1910 (No. 2315 a).

**Poa** *annua* L. Kurdistan. Turc. distr. Hakkîari: supra pagum Hašitha dit. Ğulamerek, inter muscos ad fontem alt. ca. 1700 *m.* 18. VI. 1910 (No. 3371).

*P. pratensis* L. Kurdistan. Turc. distr. Šerîzor: ad pagum Dêr Harîr inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in prato humido alt. ca. 650 *m.* 20. V. 1910 (No. 3275 et 3286).

*P. alpina* L. Kurdistan. Turc. distr. Hakkîari (Taurus Armenus): mons Harefta inter pagos Baškala et Kočânes, in pascuis alpinis alt. ca. 2700 *m.* 1. IX. 1910 (No. 3379).

*P. bulbosa* L. f. *vivipara*. Kurdistan. Turc. distr. Šerîzor: Kurruk-Dağ prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), ad fontem alt. ca. 1600 *m.* 22. V. 1910 (3347).

*P. Sinaica* Steud. Persia austro-occid. (Susiana): in steppis inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), 24. III. 1910 (No. 3301).

*P. Timoleonis* Heldr. f. *vivipara*. Kurdistan. Persica: in convalle umbrosa humida infra pagum Režâb dit. Ķasr-i-Šîrîn (Hanikîn), alt. ca. 1700 *m.* 4. V. 1910 (No. 3350).

*P. caesia* Sm. Kurdistan. Turc. distr. Hakkîari: mons Dwîle supra pagum Hašitha dit. Ğulamerek, in pascuis alt. ca. 1900 *m.* 18. VI. 1910 (No. 3406).

*P. Persica* Trin. Persia austro-occid. (Susiana): in steppis ad fluv. Čekâb inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran), 24. III. 1910 (No. 3303); in planitie inter Deilerûn et fluv. Tîb, 27. III. 1910 (No. 3421). Kurdistan. Turc. distr. Šerîzor: ad pagum Dêr Harîr inter Erbil (Arbela)

et Rewandûz, in humidis alt. ca. 650 m. 20. V. 1910 (No. 3393); ad pagum Kân-i-Watman eiusdem dit., alt. ca. 950 m. 21. V. 1910 (No. 3389); ad Rewandûz dit. Erbil, ad rivum alt. ca. 550 m. 22. V. 1910 (No. 3387); traiectus Serderian prope Rewandûz, alt. ca. 1200 m. 24. V. 1910 (No. 3388).

*P. Persica* Trin. var. *maior* Boiss. [Pag. 20., fig. 7.]. *Glumellis* ca. 4 mm longis, 5-nervibus, ad carinam a basi usque fere ad medium et ad nervos marginales basi patule barbatis. Kurdist. Turc. distr. Hakkari: mons Rêşa d'Amadia inter pagos Haşitha et Amadia, in apricis alt. ca. 1500 m. 22. VI. 1910 (No. 3256).

*Festuca sulcata* (Hackel) Nym. Schleich. Kurdist. Turc. distr. Hakkari (Taurus Armenus): mons Harefta inter pagos Başkala et Koçânes, alt. ca. 2700 m. 30. VIII. 1910 (No. 3378); Ğelo-Dar dit. Ğulamerik, ad tentoria aestiva Djezra, in fissuris rupium calcar. nigri alt. ca. 2800 m. 3. IX. 1910 (No. 3408).



Fig. 7.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1, 2 *Poa Persica* Trin. var. *maior* Boiss. Glumellae ca.  $\frac{5}{4}$ ; 3—6 *Bromus scoparius* L. 3 spicula ca.  $1\frac{5}{16}$ , 4 gluma, 5 palea, 6 glumella (4—6 ca.  $\frac{4}{1}$ ); 7—10 *Bromus tomentellus* Boiss. var. *Tauricolus* Nk. 7, 8 glumae, 9 palea, 10 glumella (7—10 ca.  $\frac{4}{1}$ ).

*F. arundinacea* Schreb. var. *genuina* Hackel subvar. *orientalis* Hack. [cf. Aschers.-Graebn. Synopsis II. pag. 506]. Palaestina: El-Muchraka in monte Karmelo dit. Haifa, in rupestribus alt. ca. 500 m. 2. V. 1909 (No. 3135).

*F. pratensis* Huds. var. *subspicata* A. et G. [Cf. Ascherson-Graebner, Synopsis II. pag. 503]. Arabia Petraea: 'Ain es-Sawe in Wâdi Buseira inter Eş-Şôbak et Wâdi Mûsa (Petra), 17. VI. 1909 (No. 3181); Ğerba inter Ma'an et Şôbak 21. VI. 1909 (No. 3196).

*Vulpia ciliata* (Pers.) Link. f. *exigua*. Persia austro-occid.: ruinae Susorum, ad terram nudam subsalsam. 16. III. 1910 (No. 3202).

*Nardurus tenuiflorus* (Schrader) Boiss. Kurdist. Turc. (Assyria): ad pagum 'Ain Kawa prope Erbil (Arbela), ad terram nudam aridissimam alt. ca. 380 m. 19. V. 1910 (No. 3193).

*Sclerochloa dura* (L.) Beauv. Kurdist. Turc. distr. Şerizor: inter

pagos Dêr Harîr et Baba Ğiĝik dit. Erbil (Arbela)-Rewandûz, ad terram nudam alt. ca. 650 *m.* 20. V. 1910 (No. 3392).

**Scleropoa** *procumbens* (Curt.) Boiss. var. *maior* Hand.-Mzt. [Handel-Mazzetti: Pteridoph. u. Anthoph. aus Mesopot.... IV. pag. 31] Mesopotamia: ad pagum Bakûba dit. Bardâd, in rîpa fluv. Dialla, in sabulo 1. V. 1910 (No. 3398a).

*S. rigida* (L.) Griseb. Judaea: Wâdi ed-Ğôz prope Hierosolyma, in aridis alt. ca. 600 *m.* 24. III. 1910 (No. 3210b); Wâdi el-Kelt inter Hierosolyma et Jericho, in apricis alt. ca. -150 *m.* 30. III. 1910 (No. 3210).

**Cutandia** *Memphitica* (Spreg.) Benth. [= *Scleropoa* *Memphitica* (Spreng.) Parl.] Mesopotamia: Bardâd, ad terram nudam sabulosam. 26. IV. 1910 (No. 3210a).

*C. dichotoma* (Forsk.) Hand.-Mzt. [= *Scleropoa* *dichot.* Parl.] Mesopotamia: Bardâd, ad Sitt Zobeide, ad terram nudam sabulosam. 26. IV. 1910 (No. 3206).

**Bromus** *erectus* Huds. var. *Syriacus* Boiss. Palaestina: planities Esdreton, ad Tell-el-Mutessem (Megiddo) dit. Ğenîn, in graminosis humidis. 6. V. 1909 (No. 3154).

*B. erectus* Huds. var. *tricolor* Hackel [in Kneucker, Gramineae exsiccatae 160]. Kurdist. Turc. distr. Hakkîari [Taurus Armenus]: mons Harefta inter Başkala et Koçânes, in pratis alpinis alt. ca. 2500 *m.* 31. VIII. 1910 (No. 3409); inter fluv. Howaraş et pagum Şerkônes dit. Koçânes, alt. ca. 2100 *m.* 1. IX. 1910 (No. 3341).

*B. Cappadocius* Boiss. et Bal. Kurdist. Turc. distr. Hakkîari (Taurus Armenus): mons Harefta inter pagos Başkala et Koçânes, in pascuis alpinis alt. ca. 2600 *m.* 31. VIII. 1910 (No. 3375).

*B. tomentellus* Boiss. Kurdist. Turc. distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, inter rupes calcar. alt. ca. 2400 *m.* 25. VII. 1910 (No. 3335).

*B. tomentellus* Boiss. var. nova **Tauricolus** Nk. [Tab. IV., fig. 1.; pag. 20., fig. 7.]. *Dense caespitosus. Culmorum basis incrassatae cylindrico-subbulbosae vaginis reticulatim fibrosis atro-fuscis arcte cinctae. Folia plana, longe acuminata, acuta, radicalia et culmea inferiora ca. 10 cm longa et 3 mm lata, 5—7 nervia, superiora diminuta, omnia dense velutina et praeterea praesertim radicalia longe ciliata et in pagina inferiore pilosa. Culmi recti, firmi, ad basin saepe geniculati, absque panicula plerumque ca. 20 cm alti, rarius 12—30 cm longi, glabri, striati. Paniculae erectae, contractae, 3—7-spiculatae ramis stricti, singuli aut geminati et tum valde inaequales, alter spicula sublongior, ca. 2 cm longus, alter multo brevior, 0.5 cm—1 cm longus, raro ramis terni. Rami inferiores longiores, ad formas subumbrosas usque 3 cm, raro 4 cm longi, superiores breviores. Spiculae 4—9-florae, pallide flavae, leviter violaceo-coloratae, 2—3 cm longae, laxiusculae, flores summi plerumque abortivi. Glumae manifeste inaequales, inferior brevior, ca. 9 mm longa, uninervis, anguste lanceolata,*



*longe acuminata, acuta, superior longior, ca. 12 mm longa, binervis, latius oblongo-lanceolata, minus acuminata et minus acuta. Glumella ovato-lanceolata, 7-nervis, nervis 2 lateralibus brevibus, apice acute bifida, brevissime tomentella, ciliatula, ca. 14 mm longa et 4 mm lata, arista ca. 7 mm longa, scabrida, recta aut paulum divergente terminata. Palea oblonga, obtusa, bicarinata, ad carinas breviter pectinatim-ciliata, ca. 11 mm longa et 2 mm lata. Antherae aureae, ca. 7 mm longae.*

Differt a formis typicis praesertim culmis brevioribus et firmiter, panicula strictiore, spiculis violaceo-coloratis, rhizomatibus densius caespitosus.

Crescit in Kurdist. Turc. distr. Hakkîari in montibus Ğelo-Dar dit. Ğulamerek, ad tentoria aestiva Djezra ad rupes calc. nigras alt. ca. 2900 m. Legi 3. IX. 1910 (No. 3410).

*B. tectorum* L. Persia austro-occid. (Susiana): in steppis inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran). 24. III. 1910 (No. 3309).

*B. tectorum* L. var. *longipilus* Borbás, ad var. *Širjaevi* Podp. *culmis pluribus, abbreviatis, panicula densa, contracta* vergens. Judaea: ad pagum Latrûn dit. Hierosolymorum, in lapidosis alt. ca. 300 m. 3. IV. 1909 (No. 3325).

*B. tectorum* L. var. *Širjaevi* Podp. [Podpěra: Květena Moravy VI. 2, pag. 327, Brno 1926]. Judaea: Jericho, ad terram nudam aridissimam alt. ca. -300 m. 19. III. 1909 (No. 3169). Arabia Petraea: in deserto lapidoso ad oppidum Ma'ân, 20. VI. 1909 (No. 3139a).

*B. Madritensis* L. var. *Delilei* Boiss. Persia austro-occid. (Susiana): ad pagum Banauda (Bend-i-Kîr), in ripis fluv. Âb-i-Girgir (Kârûn), 8. III. 1910 (No. 3264); in ruinis Susorum, locis humidis umbrosis ad Tell (forma umbrosa), 18. III. 1910 (No. 3263); ad fluv. Ćekâb inter Susa et Deilerûn (Deh-i-Loran), in steppa. 24. III. 1910 (No. 3417).

*B. fasciculatus* Presl. Judaea: Wâdi ed-Ĝôz prope Hierosolyma, in steppa alt. ca. 600 m, 24. III. 1909 (No. 3212); Wâdi el-Kelt inter Hierosolyma et Jericho, alt. ca. -100 m. 30. III. 1909 (No. 3205).

*B. scoparius* L. [Pag. 20., fig. 7.] Judaea: Jericho, alt. ca. -300 m. 18. III. 1909 (No. 3164); Persia austro-occid. (Susiana): ad pagum Banauda, in ripa fluv. Âb-i-Girgir (Kârûn). 8. III. 1910 (No. 3265); ad ruinas Susorum, in deserto limoso subsalso, forma *aprica, nana*. 16. III. 1910 (No. 3245).

*B. squarrosus* L. Kurdist. Turc. distr. Šerizor: ad pagum Baba Ğiĝik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in steppa alt. ca. 680 m. 20. V. 1910 (No. 3274a).

*B. squarrosus* L. var. *villosus* Koch. Kurdist. distr. Šerizor: inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğiĝik dit. Erbil (Arbela)-Rewandûz, in steppa alt. ca. 650 m. 20. V. 1910 (No. 3274).

*B. macrostachys* Desf. var. *lanuginosus* Boiss. Judaea: ad Latrûn dit. Hierosolymorum, in steppa alt. ca. 300 m. 2. IV. 1909 (No. 3219);



Palaestina orient. (Haurân): ad pagum Ğeraš (Gerasa), in steppa graminosa alt. ca. 530 *m.* 18. IV. 1909 (No. 3161).

*B. macrostachys* Desf. ssp. *Danthoniae* (Trin.) Asch. et Gr. [= *B. macrost.* var. *triaristatus* Hack.] Arabia Petraea: in agris inter Elġi (Wâdi Mûsa) et Ma'ân. 20. VI. 1909 (No. 3184). Kurdist. Persica: ad oppidum Kašr-i-Šîrîn, in steppa graminosa alt. ca. 400 *m.* 3. V. 1910 (No. 3237); in fauce infra pagum Režâb dit. Kašr-i-Šîrîn, alt. ca. 900 *m.* 4. V. 1910 (No. 3343 a); ad Sar-i-Pûl eiusdem dit., alt. ca. 500 *m.* 6. V. 1910 (No. 3344). Kurdist. Turc. distr. Šerizor: inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğîġik dit. Erbil (Arbela)-Rewandûz, in steppa alt. ca. 650 *m.* 20. V. 1910 (No. 3287 et 3279); ad pagum Kân-i-Watman eiusdem dit. alt. ca. 950 *m.* 24. V. 1910 (No. 3278). Kurdist. Turc. (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, in steppa alt. ca. 900 *m.* 7. VI. 1910 (No. 3278 a).


*B. mollis* L. f. *nana spiculis glabris*. Galilaea: 'Ain Tîne prope Tiberiadem, in lapidosis alt. ca. -200 *m.* 22. IV. 1909 (No. 3163).

**Brachypodium distachyum** (L.) R. et S. Palaestina orient.: 'Ain Šunei in Wâdi Ğeria dit. 'Ammân (Rabbath Ammon), in fruticetis alt. ca. 650 *m.* 15. IV. 1909 (No. 3171). Persia austro-occid. (Susiana): ruinae Susorum, in deserto, forma nana aprica. 16. III. 1910 (No. 3246 a). Kurdist. Persica: infra pagum Režâb dit. Kašr-i-Šîrîn, in fauce humida alt. ca. 900 *m.* 4. V. 1910 (No. 3343). Kurdist. Turc. distr. Šerizor: ad pagum Baba Ğîġik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in steppa alt. ca. 680 *m.* 20. V. 1910 (No. 3230 a). Babylonia: in glarea rivi inter pagos Salahîje (Kifri) et Tuz Chormati dit. Kerkuk, alt. ca. 350 *m.*, forma nana aprica. 11. V. 1910 (No. 3236).

*B. silvaticum* (Huds.) Roem. et Schult. Kurdist. Turc. distr. Ramorân: ad radices montis Halakur-Dağ ad septentriones ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, inter frutices alt. ca. 1500 *m.* 26. VII. 1910 (No. 3337).

**Agropyrum campestre** Gren. et Godr. var. **Warakensis** m. (Tab. II., fig. 1.; pag. 24., fig. 8.) [= *A. intermedium* Pal. Beauv. var. *campestre* Hegi (Flora v. Mitteleur. 386), *Triticum glaucum* 2. *campestre* Asch. et Gr. (Synopsis II. 1. 656), *Agropyrum glaucum* var. *campestre* Stebl. et Volkart (Fl. Schweiz 60)]. Differt ab *Agropyri intermedii* Pal. Beauv. formis *vaginarum marginibus non ciliatis*, quae nota sec. prof. Dr. Jos. Podpěra in Květena Moravy VI. pag. 356 (1926) ad *Agrop. interm.* constans esse videtur. An *Agropyri campestreis* Gren. et Godr. formae semper in *vaginarum marginibus ciliis carent*, in speciminibus originalibus constituendum est. Specimina mea *glumis acutis, nervo centrali breviter producto brevissime mucronulatis, 5—7-nerviis et glumella obtusa, (minime) mucronulata* cum diagnosi G. Rouy, Flore de France XIV. pag. 322 (1913) congruentia differunt *nervis glumarum lateralibus brevioribus, apicem non attingentibus*. Ceterum specimina mea *rhizomate non longe repenti praedita*

subcaespitosa, omnino glabra, glauca, foliis planis, apice tantum convolutis, in utraque facie scabridulis, culmis levibus, firmis, 30—40 cm (absque spica) altis, spicis brevibus, 5—7 cm longis, 9—12 spiculas gerentibus;



Del. Dr. Fr. Nábělek.

Fig. 8.

1—3 *Agropyrum campestre* Gr. et Godr. var. *Warakense* Nk. 1, 2 glumae, 3 glumella (1—3 ca.  $1\frac{5}{16}$ ); 4—7 *Agropyrum Košanini* Nk. 4—5 glumae, 6 glumella, 7 spica (4—5 ca.  $1\frac{5}{16}$ , 7 ca.  $\frac{1}{2}$ ).


spiculis 9—12 mm longis rhachidis internodia ca. duplo superantibus erecto-patulis, 5—6 floris, glumis spicularum dimidium superantibus suffultis cum Agrop. interm. Gren. et Godr. formis brevispiculatis emucronatis congruunt.

Armenia Turc.: Warak-Dağ prope Wan, ad monasterium Werin-Warak, in graminosis alt. ca. 2200 m. 23. VIII. 1910 (No. 3323).

***Agropyrum Podpěrae* Nábělek sp. nova.**

[= *Triticum Podpěrae* Nk.] Tab. III., fig. 3., pag. 24., fig. 9. *Rhizomate breviter repentis caespitosum, glaucum, undique brevissime et densissime velutino-puberulum, quod indumentum glaucedinem producit. Culmi erecti, firmi, absque spica ca. 70 cm alti, brevissime et densissime retrorsum velutino-puberuli. Vaginae indumento simili vestitae in margine non ciliatae, folia plana, ca. 5—8 mm lata, 15—20 cm longa, longe acuminata, acuta, superiora apice convoluta subulata, in utraque facie dense puberula, hispida, in margine retrorsum*

*scabra. Ligula brevissima. Spicae firmae, 8—15 cm longae, 10—12 spiculas gerentes, densae, spiculis infimis rhachidis brevissime velutinae internodiis paulo brevioribus, superioribus internodiis ca. duplo longioribus. Spiculae ca. 12—15 mm, rarius usque 20 mm longae, 4—6-florae, basi*



Del. Dr. Fr. Nábělek.

Fig. 9.

*Agropyrum Podpěrae* Nk. 1 Spiculae ca.  $\frac{1}{1}$ , 2, 3 glumae, 4, 5 glumella, 2—4 ca.  $1\frac{5}{16}$ .

*rhachidi stricte adpressae, supra medium extrorsum curvatae, apice distantes. Glumae inaequales, altera ca. 6 mm, altera ca. 8 mm longa, oblongo-lineares, obtusae, oblique subtruncatae, virides, anguste hyalino-marginatae, dorso glabrae, ad nervos scabridulae, in margine breviter ciliatae, in pagina interiore breviter, adpresse puberulae, prominenter 6-nerves, nervo medio quam nervi laterales vix crassiore paulum producto brevissime apiculatae, nervis ceteris usque ad apicem fere productis. Glumella ca. 9 mm*

*longa, obtusa aut subretusa, 5-nervis, nervo centrali supra medium validiore subcarinata eoque paulum producto breviter apiculata, nervis duobus lateralibus apice conniventibus et cum nervo medio anastomosantibus. nervis*



*marginalibus usque ad marginem fere productis. Glumella basi pallida, superne viridiuscula, ad nervos retrorsum scabridula, dorso glabra, pagina interiore ad apicem hirtella, in margine ciliata.*

Glumis (brevissime) mucronulatis et earum nervis 5—7 apicem attingentibus, glumella obtusa, mucronulata, vaginarum margine non ciliata etc. [cf. G. Rony, Flore de France XIV. pag. 322] ad *Agropyrum campestre* Gren et Godr. accedit et huius subspeciem (*Agr. camp. ssp. Podpěrae* Nk. = *Triticum campestre* Nyman ssp. *Podpěrae* Nk.) forsán formans, spiculis parvis *Agr. camp. f. microstachya* Uechtrik apud Oborny, Flora d. Znaimer Kreises V. N. V. Br. XVII. p. 139 (1879) = *Agrop. intermedium* Pal. Beauv. B. latronum *Podp.* [cf. *Podpěra*, Květena Moravy VI. 2. pag. 358] referens, sed glumis obtusis nec subacutis et imprimis indumento ab omnibus *Agrop. campestris* formis discedens.

Kurdist. Turc. distr. Ramorân: mons Mirgamira ad pagum Šernach ad orientem ab oppido S'ert, inter frutices quercuum alt. ca. 1500 m 24. VII. 1910 (No. 3313).

**Agropyrum Košanini** Nábělek sp. nova [= *Triticum Košanini* Nk.] Tab. II., fig. 3.; pag. 24., fig. 8. *Rhizomate non longe repenti caespitosum, valde glaucum, in omnibus partibus densissime et brevissime velutino-pubescent, quod indumentum glaucedinem praesertim ad vaginas inferiores subcaeruleam profert. Culmi erecti, graciles, absque spica 35—40 cm [alti, dense et brevissime, inferne retrorsum, superne patule velutino-puberuli. Vaginae densissime et brevissime retrorsum velutino-puberulae, praesertim inferiores caeruleo-glaucae, in margine brevissime ciliatae (ciliis ab indumento cetero non differentibus), ore oblique subauriculato. Ligula brevissima. Folia omnia erecta, firma, anguste linearia, convoluta, subulata, 15—20 cm longa, in utraque facie retrorsum scabra, breviter puberula, nervis utrimque prominulis. Spicae graciles, 10—15 cm longae, 5—8 spiculas gerentes, laxae. Spiculae ca. 15 mm longae, 6—8-florae, inferiores distantes, rhachidis brevissime puberulae internodia vix aequantes, superiores rhachidis internodiis brevioribus magis approximatae, rhachidi usque ad medium adpressae, apice paulum extus curvatae. Glumae inaequales, altera 6—7 mm, altera 8—9 mm longae, glabrae, ad nervos minime scabriusculae, pallide virides, anguste obovato-lineares, obtusissimae, apice suboblique truncatulae, hyalino-marginatae, 5-nerves, nervo medio et duobus lateralibus longioribus, duobus ceteris brevioribus, medio solo apicem subattingente, numquam supra apicem producto. Glumella ca. 9 mm longa, oblongo-lanceolata, acutiuscula glabra, solum in margine hyalina minime puberula, 5-nervis, nervo medio apicem attingenti sed vix producto, duobus lateralibus brevioribus, apice conniventibus et cum medio anastomosantibus, marginalibus longioribus, sed apicem non attingentibus.*

*Indumento Agropyro Podpěrae simile, sed magis glaucum, gracilius,*



*foliis omnibus convolutis, spicis laxioribus, spiculis brevioribus, glumis obtusioribus, latius hyalino-marginatis, non apiculatis, glumellis acutiusculis, vix apiculatis ab eo distinctum.*

Glumis spicularum dimidium superantibus, obtusissimis, oblique truncatis, muticis, 5—7-nervibus, nervo mediano solo apicem attingenti, glumellae nervatura, vaginis margine ciliolatis [cf. G. Rouy, Flore de France XIV. pag. 322] ad *Agropyrum intermedium* Pal. Beauv. accedit et eius subspeciem (*Agrop. interm. ssp. Košanini* Nk., *Triticum intermedium* Host. ssp. *Košanini* Nk.) forsan formans, sed glaucescentia subcaerulea indumento producta, glumellis acutiusculis nec obtusis nec mucronulatis, et imprimis indumento ei *Agrop. Podpěrae* Nk. simili ab *Agrop. intermedi*i formis distinctum. Habitu *Agropyrum Tauri* Boiss. et Bal. refert, a quo (sec. descriptionem) foliorum nervis utrimque prominentibus (nec facie superiore subnervibus), glumis glumellae fere aequilongis (nec flosculo tertia parte brevioribus), utraque quinquenervi (nec inferiore 3-nervi), glumella oblongo-lanceolata acutiuscula (nec oblongo-lineari obtusa) quinquenervi (nec obsolete trinervi) et imprimis indumento distinctum.

Kurdist. Turc. distr. Ramorân: mons Halakur-Dar ad septentr. ab oppido Ġezîret-ibn-Ômar, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 2400 m. 25. VII. 1910 (No. 3336).

*A. cristatum* (Schreb.) Pal. Beauv. var. nova **incanum** Nábèlek [= *Triticum cristatum* Schreb. var. *incanum* Nk.] (Tab. IV., fig. 2.\*)  
*In omnibus partibus: ad culmum, vaginas et foliorum utramque paginam dense brevissime incano-puberulum, pube culmi et vaginarum reflexa. Ceterum culmi recti, firmi, basi geniculati, 25—30 cm alti, basi vaginis foliorum emarcidorum, denique in fibras parallelas ± solutis crasse involucrati, folia radicalia rigida, recta, anguste convoluta, 10—12 cm longa, folia culmea plana, inferiora 8—10 cm longa et ca. 3 mm lata, plerumque 5-nervia, nervis pallidis, in utraque facie prominentibus, dense breviter puberulis, foliis superioribus abbreviatis, 3, 2 et 1 cm longis. Spica abbreviata, ovato-oblonga, densa, 2—3.5 cm longa, rhachide puberula, spiculis dense et longe villosis, violaceo-suffusis, ceterum eis var. imbricati Asch. et Gr. (Synopsis II. pag. 669) = var. puberuli Boiss. et Hoh. similibus.*

Kurdist. Turc. distr. Hakkîari: Ġelo-Dar dit. Ġulamerik, ad tentoria aestiva Djezra, in fissuris rupium calcar. nigrarum alt. ca. 2900 m. 3. IX. 1910 (No. 3413 et 3373). Inter specim. Kotschyana „*Triticipuberuli* Boiss.“ e graminosis ad radices montis Demavend [Kotschy, Plantae Persiae borealis 1843 No. 374] in herbario Mus. Palat. Vindob. specimen unicum cum meis congruens, in omnibus partibus incano-puberulum. Specimina altera omnia spiculis tantum hirsutis, ceterum glabra = *Agr. cristatum* P. B. var. *puberulum* Boiss. et Hoh.

\* Tabularum partis IV. (harum publ. No. 105).

A. Orientale (L.) R. et Sch. var. *lasianthum* Boiss. Arabia Petraea: ad oppidum Ma'ân, in deserto lapidoso 20. VI. 1909 (No. 3139). Kurdistan. Turc.: Ğebel Hamrîn inter Bardâd (Bakûba) et Hanikîn, in steppa alt. ca. 200 *m*. 2. V. 1910 (No. 3427).

**Secale** montanum Gass. var. *Anatolicum* Boiss. Kurdistan. Turc. distr. Berwari: supra pagum Aradên dit. Amadia, in quercetis alt. ca. 1200 *m*. 16. VI. 1910 (No. 3401). Kurdistan. distr. Ramorân: ad radices montis Halakur-Dar ad septentriones ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in quercetis alt. ca. 1300 *m* copiosum. 26. VII. 1910 (No. 3312). Armenia Turc.: Warak-Dar dit. Wan, ad monasterium Werin-Warak, in graminosis alt. ca. 2200 *m*. 23. VII. 1910 (No. 3319).

**Heteranthelium** piliferum Hochst. Kurdistan. Persica: Ķasr-i-Ŝirîn dit. Hanikîn, in steppa alt. ca. 400 *m*. 7. V. 1910 (No. 3354).

**Triticum** Thaoudar Reut. [= *Tr. monococcum* L. var. *lasiorhachis* Boiss., *Tr. aegilopoides* (Link.) Bal. ssp. *Thaoudar* Reut.]



Fig. 10.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1, 2 *Triticum* Thaoudar Reut. f. *hirtiglumis* m. 3, 4 *Triticum* *dicoccoides* Körnicke f. *Straussiana* A. Schulz f. *nudiglumis* m. (1 et 4 ca.  $\frac{2}{1}$ ).

(Pag. 27., fig. 10.). Adsunt formae duae: forma **nudiglumis** *glumis et glumellis glabris*, et forma **hirtiglumis** *glumis et glumellis*  $\pm$  *dense hirtis*.

*T. dicoccoides* Körnicke f. *Straussiana* A. Schulz (Pag. 27., fig. 10.) [„Über eine neue spontane Eutriticumform: *Triticum* *dicoccoides* Keke. forma *Straussiana*“, in Ber. d. Deutschen Botan. Ges. XXXI (1913) p. 226] = *Tr. vulgare* Vill. var. *dicoccoides* Keke. = *Fr. dicoccum* Schrank A. *dicoccoides* Asch. Gr. (Synopsis II. 1. p. 679), cf. Flaksberger, Opred. pšeníc 48, 1915. Adsunt etiam huius speciei formae duae: forma **nudiglumis** *glumis et glumellis glabris*, et forma **hirtiglumis** *glumis et glumellis patule hirtis usque subsericeo-revulinis*.

Kurdist. Turc. distr. Šerizor: inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğîğik dit. Erbil (Arbela)-Rewandûz, in steppa inter frutices quercuum alt. ca. 650 m, f. nudiglumis, 20. V. 1910 (No. 2388); ad pagum Kân-i-Watman eiusdem ditionis inter frutices quercuum alt. ca. 950 m formae hirtiglumes et nudiglumes, *dente carinali 1.5 usque 2.5 mm longo, ± acuto, recto aut parum extus spectanti, foliis in utraque facie, vaginis et praesertim vaginarum ore longe pilosis, vaginarum margine ciliata*. 24. V. 1910 (No. 3277 f. nudiglumis, No. 3390 f. hirtiglumis). Kurdist. Turc. (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Mostûl, in steppis in declivit. lapidosis aridis alt. 1000—1100 m, solum f. nudiglumis cum Tr. Thaoudar, sed minus copiose. 10. VI. 1910 (No. 3314 a). Kurdistan. Turc. distr. Berwari: ad pagum Šêch Mâma dit. Amadia, in steppa alt. ca. 900 m. Forma hirtiglumis, *glumis et glumellis molliter subsericeo-velutinis, culmis usque 4 mm crassis (absque vagina) et fere 1 m altis, spicis (sine aristis) 7—8 cm longis et 1 cm crassis, spiculis semper 3-floris*




Fig. 11.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

1—5 *Triticum dicoccoides* Körnicke f. *Straussiana* A. Schulz. 6 *Triticum Thaoudar* Reut. Glumae dentes.

*et dispermis usque 2 cm longis, glumis ca. 12 mm longis, aristis usque 17 cm attingentibus*. 23. VI. 1910 (No. 3327).

Glumae dentes variant: carinalis 1.5—2.5 mm longus, ± acutus, apicis extremitate saepissime introrsum spectans, ceterum axi sua ± extrorsum directus; dens lateralis multo brevior, late triangularis, ± acutus, interdum rotundatus et obtusus usque fere obsoletus, nervus in eum ingrediens plerumque prominens, saepe acutus, anguste carinatus. Palea glumellam longitudine superans usque 17 mm longa, bicarinata, carinis acutis superne alaeformibus, scabris, etiam ad formas hirtiglumes apice bifida brevissime hirtella excepta glabra, inter carinas sulcata. Caryopsis flavo-rosea, ventre profunde anguste sulcata, sulci marginibus rotundatis, apice pilis flavis vestita, libera, ca. 10 mm longa.

*Triticum Thaoudar* formae a *Tr. dicoccoidis* formis glumae dentibus ambo acutis, rectis, palea glumellam longitudine vix superanti spiculis plerumque bifloris (nec trifloris), caryopside minore (ca. 7—8 mm longa), intensius colorata, sulci marginibus acutis, et culmi nodiis dense albo-villosulis (ad *Tr. dicocc.* glabris aut brevissime puberulis) discernendae.



Tr. *Dicoccoides*, f. *Straussiana*, hucusque ex loco unico in Noa-Kuh Persiae dit. Kerind notum, ubi a Th. Strauss anno 1910 detectum est [cf. Bornmüller: Reliquiae Straussianae in Beih. Botan. Centralbl. XXXIII. 2. pag. 217, A. Schulz l. c. pag. 227]. Tr. *dicoccoidis* forma altera *Kotschyana* A. Schulz ex Syria (Kotschy, Aaronsohn) nota est.

Tr. *aestivum* L. var. *albidum* Alef. Mesopotamia: ad Baḏād cultum. 26. IV. 1910 (No. 3315b).

Tr. *turgidum* L. Kurdist. Turc. Ğebel Hamrîn inter Bakûba et Hanikîn, in steppa alt. ca. 200 *m* subspontaneum. 2. V. 1910 (No. 3334).

Tr. *durum* Desf. Kurdist. Turc.: ad pagum Maltai dit. Mōṣul cultum. 6. VI. 1910 (No 3396).

**Aegilops ovata** L. [= *Triticum ovatum* Gren. et Godr.] forma **nudiglumis** m. *glumis et glumellis ad nervos scabris, ceterum glabris*. Judaea: Jericho, in semideserto alt. ca. - 300 *m*. 19. III. 1909 (No. 3166). Obs. Ae. *ovata* variat *glumis glabris* aut  $\pm$  *hirtis*: Ae. *ov.*  $\delta$  *pubiglumis* (J. et F.) in Rouy: Flore de France XIV. pag. 332.

Kurdist. Turc. (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Mōṣul, in steppis in declivit. lapidosis aridis alt. ca. 1100 *m*. copiosissimum, solum f. *hirtiglumis*, *robusta, culmos plerumque plures (usque 5), absque vaginis. inferne 3 mm crassos et absque spica usque 70 cm altos edens, spiculis semper bifloris usque 17 mm longis, flore utroque fertili, aristis altera usque 16 cm, altera ca 13 cm longis*. 8. VI. 1910 (No. 3314). Mesopotamia superior: Ğebel et Tûr (Tur Abdîn), ad oppidum Midiat, in steppis alt. ca. 950 *m*. 10. VII. 1910 (No. 3368, f. *nudiglumis*, No. 3368 a f. *hirtiglumis*); ad pagum Chandûk ad Tigridem infra pagum Hassan Kef (Hisn Keifa), in steppa alt. ca 350 *m* copiosissime (formae culmos complures — usque 10 — edentes). 12. VII. 1910 (No. 3315 f. *nudiglumis*, No. 3315 a f. *hirtiglumis*).

Ae. *triaristata* Willd. [= Ae. *ovata* var. *triaristata* Cosson e Dur., Boiss., = Ae. *ovata* ssp. II. *triaristata* (Willd.) Rouy l. c. pag. 333. *Triticum ovatum* Gren. et Godr. B. I. *triaristatum* Asch. et Gr. Syn. II. 705] forma *glabrescens* Podpéra (in Ein Beitrag zu d. Vegetations-Verhältnissen von Südbulgarien [Ostrumelien], Verh. d. zoolog.-botan. Gesellschaft Wien 1902 pag. 683). Galilaea: 'Ain Tabṛa ad Tiberiadem, in rupestribus alt. ca. - 200 *m*. 22. IV. 1909 (No. 3143).

Ae. *triaristata* Willd. forma *velutina* Podpéra (l. c. pag. 683), *glumis et glumellis densissime et longe patule velutino-hirtis, indumento parum densiore quam ad specim. Podpérana* ex Bulgaria (Harmanlij) in herbario Instituti botanici Universitatis Masarykianae Brno. Kurdist. Persica: ad Kaṣr-i-Širîn dit. Hanikîn, in steppa alt. ca. 400 *m*. 7. V. 1910 (No 3353). Kurdist. Turc. (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Mōṣul, in steppa alt. ca. 900—1000 *m*. Forma *glumis spicularum infimarum usque 11 mm (absque aristis) longis, aristis 4.5 cm attingentibus, spiculis fere 5 mm crassis*. 8. VI. 1910 (No 3257).

Obs. *Ae. macrochaeta* Shuttlew. et Huet (*Ae. ovata* ssp. *macrochaeta* Rouy, Flore de France XIV. pag. 332), si non „spiculis 2—3 ellipsoideis, omnibus subaequalibus et fertilibus, numquam ventricosoinflatis“, quae nota ad specim. ex Castelnau, Herault (leg. Mandon) in herb. Instituti botan. universit. Brno non constans esse videtur, nullo modo ab *Ae. triaristatae* formis velutinis differt. Glumarum indumentum non *Ae. macrochaetae* notam propriam format, nec speciei nec uti varietatis („*Aegilops ovata*  $\beta$  *triaristata* var. *macrochaeta*“ in Halácsy, Conspectus florum Graecae III. pag. 431).

*Ae. bicornis* (Forsk.) Jaub. et Sp. [*Triticum speltoides* Godr. II. *Ligusticum* Asch. et Gr.] Etiam haec species variat *glumis et glumellis glabris* — f. **nudiglumis** — solum ad nervos et in margine scabridulis, et *glumis et glumellis*  $\pm$  dense et longiuscule prorsus scabrido-hirtis — f. **hirtiglumis** m. Kurdist. Turc. (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, in steppis alt. 800—1100 m. 7. et 10. VI. 1910 (No. 3257 a, 3265).

*Ae. triuncinalis* L. Kurdist. Persica: infra pagum Režâb dit. Kasr-i-Şîrîn, in steppa alt. ca. 800 m. 6. V. 1910 (No. 3345). Kurdist. Turc. distr. Şerizor: inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğîĝik dit. Erbil (Arbela)-Revandûz, in steppa alt. ca. 700 m. 20. V. 1910 (No. 3143 a); Assyria: ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, in steppa alt. ca. 900 m. 10. VI. 1910 (No. 3394); Mesopotamia superior: ad pagum Chandûk ad Tigridem dit. Hassan Kef (Hisn Keifa), in agris incultis alt. ca. 350 m. 11. VII. 1910 (No. 3367).

*Ae. Aucheri* Boiss. [= *Triticum speltoides* Godr. A. *Aucheri* Asch. et Gr.] forma **nudiglumis** m. *glumis, glumellis et rhachide glabris, solum ad glumarum et glumellarum nervos et ad rhachidis marginem scabridulis. Rhachis et glumarum nervi albidî, culmi elati, absque spica usque 1.2 m alti, glaberrimi, nitidi, longitudinaliter albido-striati, spica absque aristis 14—16 cm longa, usque 15-spiculata. Vaginae etiam infimae glaberrimae, folia solum (usque 20 cm longa) in utraque pagina parce pilosa.* Kurdist. Turc. (Assyria): ad Altunköpri inter Kerkuk et Erbil (Arbela), ad fossam irrigationis alt. ca. 260 m. 17. V. 1910 (No. 3308).

*Ae. Aucheri* Boiss. forma **hirtiglumis** m., *glumis, glumellis et rhachide*  $\pm$  dense et longe prorsus scabrido-hirtis usque patule hirsutis. Variat etiam *spicis crassioribus aut tenuioribus, spiculis rhachidis nodos superantibus aut subaequantibus, spicularum numero (4—8) etc.* Kurdist. Turc. (Assyria): ad pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môşul, in steppis alt. 800—1100 m. 7. VI. 1910 (No. 3361). Kurdist. Turc. distr. Şerizor: ad pagum Baba Ğîĝik inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in steppa alt. ca. 700 m. 20. V. 1910 (No. 3361 a).

*Ae. Aucheri* Boiss. var. nova **Schulzii** Nábělek [= *Triticum speltoides* Godr. var. *Schulzii* Nk.] Tab. III., fig. 1.; pag. 31., fig. 12. *Indumento glumarum, glumellarum et rhachidis dense et molliter prorsus*



subvelutino co ceterarum formarum hirtiglumium densiore et praesertim molli a formis hirtiglumis discedens. Spicae 5—8 cm longae, 4—7 spiculatae. Spiculae ca. 10 mm longae plerumque rhachidis internodiis subaequilongae aut (praesertim mediae) breviores, 3—4-florae, spicula terminalis usque 13 mm longa etiam 5-flora; glumae breves, 4—6 mm longae, 6—8-nerves, apice truncatae, omnino muticae aut mucrone brevissimo late triangulari vix prominulo mucronulatae, extus hirsutae, canescenti-virides, intus glaberrimae, nitidae, citrinae. Glumella spicularum lateralium supra medium carinata, carina in mucronem triangularem  $\pm$  acutum, ca. 1 mm longum, in spicula terminali in aristam, usque 7 cm longam producta, apice praeter mucronem 2 dentibus lateralibus brevissimis  $\pm$  rotundatis praedita. In spicula terminali glumella etiam floris tertii in mucronem ca. 2 mm, raro usque 6 mm longum producta. Glumella ceterum 5-nervis, basipallida, glaberrima, nitida, supra medium pallide canescenti-viridis, hirsuta, floris in spicula infimi ca. 10 mm longa, florum superiorum brevior. Palea acutissime alato-bicarinata, praeter carinas ciliatulas et summum apicem hirtellam glabra. Rhachis, glumae, glumellae in apice et aristae interdum violaceo-suffusae. Culmus infra rhachidis articulationem statim glaberrimus, glaucus, absque spica 30—40 cm altus, basi geniculato-adsendens, infra medium foliatus. Folia glauca, abbreviata, longissima ca. 6 cm, sed etiam 2 cm longa, inferiora plana, superiora (an viva?) convoluta et subulata, reflexa (an viva?), in utraque facie parcissime pilosa. Vaginae superiores glabrae, infimae pilosae.

Formam solum hirtiglumem huius varietatis inveni. An etiam f. nudiglumis praestat? Kurdist. Persica: ad oppidum Kasr-i-Širîn dit. Hanikîn, in steppa alt. ca. 400 m. 7. V. 1910 (No. 3351).

**Lolium temulentum** L. Mesopotamia: Kerbela, ad fossas irrigationis. 14. IV. 1910 (No. 3271).

L. temulentum L. var. muticum Boiss. = L. speciosum Ster. Palaestina: planities Esdrelon, inter Haifa et Nazareth, in graminosis humidis. 3. V. 1909 (No. 3178). Kurdist. Persica: ad pagum Sar-i-Pûl dit. Kasr-i-Širîn, in prato irrigato alt. ca. 500 m. 7. V. 1910 (No. 3348a.)

**Hordeum spontaneum** K. Koch. [Tab. IV., fig. 3.; pag. 32., 33., fig. 13., 14.] Adsunt huius speciei varietates tres:

1. Varietas spiculis lateralibus breviter stipitatis, glumis omnibus a basi usque ad apicem dense sericeo-plumosis, glumellis spicularum lateralium apice obtusis, muticis. Rhachilla producta, usque 10 mm longa, plumosa. Ceterum rhachidis fragillissimae articulis in lateribus longiuscule sericeo-hirtis, arista spiculae intermediae usque 27 cm



Del. Dr. Fr. Nábělek.

Fig. 12.  
Aegilops Aucheri  
Boiss. var. Schulzii  
Nk.  $\frac{1}{1}$ .



*longa et ad basin usque 3 mm lata: H. spontaneum K. Koch var. Ithaburense* (Boiss.) m. [= *H. Ithaburense* Boiss. pro specie.]

2. Varietas *spiculis lateralibus longius stipitatis* (*stipitibus usque ca. 2 mm longis*), *glumis minus longe sed tamen sericeo-hirsutis*, *glumis spiculae intermediae fertilis solum ad basin hirsutis*, *supra subglabris*, *glumellis spicularum lateralium apice breviter triangulari-acuminatis*, *acutis*. *Rhachilla brevissima aut ad pilos nonnullos reducta*. *Ceterum rhachidis fragillissimae articulis in lateribus brevius et angustius sericeo-hirsutis*, *arista spiculae intermediae minus valida*, *10 cm longitudine raro attingens*, *1—1.5 mm basi lata: H. spontaneum K. Koch var. ischnatherum* (Cosson) Thellung [= *H. ischnatherum* Körn. pro spec.].




Fig. 13.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

*Hordeum spontaneum* K. Koch. 1—3 var. *Ithaburense* (Boiss.) Nk., 4—6 var. *ischnatherum* (Coss.) Thell., 1—5 ca.  $1\frac{3}{4}$ , 6 basis spiculae centralis cum rhachillae rudimento, ca.  $\frac{5}{16}$ .

3. Varietas *spiculis lateralibus stipitibus usque 3 mm longis suffultis*, *glumis breviter sericeo-plumosis* (sicut ad var. *ischnatherum*), *glumellis spicularum lateralium apice longe acuminatis*, *in mucronem longitudine in eadem spica inter 1—6 mm variantem productis*, *aut arista usque 3.5 cm longa terminatis*. *Rhachilla brevis*, *ca. 3—5 mm longa*, *plumosa*. *Ceterum rhachidis fragillissimae articuli in lateribus breviter et anguste sericeo-hirsuti*, *arista spiculae intermediae valida*, *usque 19 cm longa et basi ca. 2 mm lata: H. spontaneum K. Koch. var. Proskowetzii* Nábělek (*H. Proskowetzii* Nk. pro spec. in schedā), *forma mucronata m. et f. aristata m.*

Varietatem *Ithaburensem* in Palaestina solum repperi: in Judaea: Wādi el-Kelt inter Hierosolyma et Jericho, in declivitatibus aridissimis alt. ca. -50 m usque -150 m, 30. III. 1909 (No. 3204); Galilaea: Tiberias, ad rupes supra oppidum et ad fontes 'Ain Tabra, alt. ca. -200 m. 21. et

23. IV. 1909 (No. 3192 et 3152); ad oppidum Šafed, inter rupes alt. ca. 650 *m*, 23. IV. 1909 (No. 3149); Ğebel Mâr Elias (Karmel), ad El-Muchraka, inter frutices alt. ca. 500 *m*, 2. V. 1909 (No. 3177); planities Esdrelon inter Haifa et Nazareth. 3. V. 1909 (No. 3233). In Mesopotamia et Kurdistania hanc varietatem nondum inveni, et haec varietas *Hordei* spontanei forma occidentalis esse videtur.

Varietatem *ischnatherum* vidi copiosam in steppis Persiae austro-orient. (Susianae): ad ruinas Susorum, 15. III. 1910 (No. 3244), inter Susa et Deilerûn (Deh-i-Loran) ad radices montium Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh), praesertim in alveolis et inter frutices *Zizyphi nummulariae* fre-




Fig. 14.

Del. Dr. Fr. Nábelek.

*Hordeum spontaneum* K. Koch. var. *Proskowetzii* Nk. 1—3 forma aristata *m.* e steppis Persiae austro-occidentalis (Susianae), No. 3261; 4—8 forma mucronata *m.* e Kurdistania Turcica e steppis ad pagum Mâr Jakub dit. Môsul (No. 3430); 4 glumella lateralis spicularum infimarum, 5, 6, 7 spicularum superiorum, 8 spicularum summarum (1—8 ca.  $1\frac{5}{1}$ ).

quentissimam. 24. III. 1910 (No. 3262 et 3416). Haec varietas *Hordei* spontanei forma austro-orientalis persica esse videtur, nam specim. nonnulla in Persia austro-occidentali (Susiana) a me collecta omnia ad hanc varietatem pertinent.

Varietatis *Proskowetzii* formam mucronatam in Kurdist. Turc. a pagum Mâr Jakub supra pagum Simel dit. Môsul, in steppis lapidosis et saxosis alt. ca. 900 *m*—1100 *m* frequentissimam vidi (8. VI. 1910, No. 3430, No. 3398 forma glumarum indumento et rhachilla longiore ad var. *Ithaburensem* vergens). Formam aristatam in monticulis Kuh Bejât (Ğebel Hamrîn) in Persia austro-occid. inter Deilerûn (Deh-i-Loran) et oppidum Amara ad Tigridem in steppis ad solum argilosum legi 27. III. 1910 (No. 3261).

*H. vulgare* L. s. str. Ubique cultum et in agris incultis sub-

spontanum. Palaestina: Ğebel Mâr Elias (Karmel), ad El-Muchraka, in agris cultis et incultis alt. usque ca. 450 *m.* 2. V. 1909 (No. 3133). Mesopotamia: Bardâd, cultum. 26. IV. 1910 (No. 3363).

*H. distichon* L. f. *caryopsibus nigris, aristis scabris, pallidis*. In Kurdist. Assy. saepe cultum. Ad Chân Abu Ğisr dit. Baġuba, 1. V. 1910 (No. 3428); inter Kerkuk et Altunköpri alt. ca. 300 *m.* 17. V. 1910 (No. 3234).

*H. leporinum* Link. Judaea: Jericho, -300 *m.*, 19. III. 1909 (No. 3165); Wâdi el-Kelt inter Hierosolyma et Jericho, ca. -100 *m.* 30. III. 1909 (No. 3207). Arabia Petraea: in deserto lapidoso ad oppidum Ma'ân, f. aprica nana. 21. VI. 1909 (No. 3147). Mesopotamia: Babylon. 28. IV. 1910 (No. 3281). Persia austro-occid. (Susiana): ad limum sabulosum in ripa fluv. Ćekâb inter ruinas Susorum et Deilerûn (Deh-i-Loran) frequens. 24. III. 1910 (No. 3418). Kurdist. Turc. (Assyria): inter Altunköpri et Erbil (Arbela), praesertim ad fossas irrigationis alt. 250—300 *m.* 18. V. 1910 (No. 3310).

*H. maritimum* With. Galilaea: 'Ain Tine et 'Ain Tabra prope Tiberiadem, ad fontes alt. ca. -200 *m.* 22. IV. 1909 (No. 3130 et 3162). Kurdist. Persica: ad pagum Sar-i-Pâl dit. Ķasr-i-Širîn, in pratis irrigatis alt. ca. 500 *m.* 7. V. 1910 (No. 3348).

*H. bulbosum* L. Galilaea: Tiberias, in rupestribus alt. ca. -200 *m.* 21. IV. 1909 (No. 3141). Libanon: Hammâna dit. Brumâna, Ğebel Kenîse, alt. ca. 1000 *m.* 16. XI. 1910 (No. 3195). Moab: Rabba (Rabbath Moab) inter Mâdaba et El-Kerak, in steppa alt. ca. 800 *m.* 25. VI. 1909 (No. 3217). Kurdist. Turc. (Assyria): in steppis inter Baġûba et Hanikîn, praesertim in Ğebel Hamrîn, alt. 180—250 *m.*, frequens, forma *robusta, culmis usque 1.5 m altis, spicis usque 15 cm longis*. 1. V. 1910 (No. 3425); in steppis inter Altunköpri et Erbil (Arbela), alt. ca. 250—300 *m.* 18. V. 1910 (No. 3307). Kurdist. Turc. distr. Berwari: ad pagum 'Ain Nâne inter Amadia et Hašîtha, inter frutices quercuum alt. ca. 1500 *m.* 16. VI. 1910 (No. 3372).

*H. fragile* Boiss. [*Spicae maturae rhachis valde fragilis!*] Kurdist. Turc. distr. Hakkîari: mons Dwîle supra pagum Hašîtha dit. Ğulamerik, in fissuris rupium graniticarum alt. ca. 1900 *m.*, 18. VI. 1910 (No. 3431); mons Maidanoke eiusdem ditionis, inter rupes calcareas alt. ca. 2000 *m.* 20. VI. 1910 (No. 3360). Kurdist. distr. Ramorân: Halakur-Dar ad septentriones ab oppido Ğezîret-ibn-Ômar, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 1800 *m.* 25. VII. 1910 (No. 3326). Taurus Armenus: Warak-Dar dit. Wan, inter rupes graniticas alt. ca. 2650 *m.* 23. VIII. 1910 (No. 3322).

*Elymus* Caput Medusae L. s. str. Kurdist. Turc. (Assyria): in steppis inter Kerkuk, Altunköpri et Erbil (Arbela) frequens. 17. et 18. V. 1910 (No. 3306 et 3429).

*E. crinitus* Schreb. Kurdist. Persica: infra pagum Režâb dit. Ķasr-i-Širîn, in steppa alt. ca. 900 *m.* 4. V. 1910 (No. 3342). Kurdist.



Turc. distr. Berwari: mons Choarra-Sia supra pagum 'Ain Nûne inter Amadia et Hašitha, in quercetis alt. ca. 1500 *m.* 16. VI. 1910 (No. 3369).

E. Delileanus Schult. Judaea: Wâdi ed-Ğôz dit. Hierosolymorum, alt. ca. 650 *m.* 24. III. 1909 (No. 3430 a).

## Gymnospermae.

### Pinaceae.

**Pinus Halepensis** Mill. Kurdist. Turc.: in valle fluv. Bochtan dit. S'ert (conos misit missionarius Dominicanus M. Boissier). Mamuret-ül-Aziz: in valle fluv. Erkenek-Su inter Malatia et Mar'as, ad solum graniticum alt. ca. 900 *m.* Locus maxime orientalis huius regionis. 11. X. 1910 (No. 4544).

**Cedrus Libani** Barr. In Tauro distr. Mamuret-ül-Aziz inter pagos Melanli et Nağarli dit. Mar'as alt. ca. 900—1100 *m* cum Junipero excelsa et *J. faetidissima* silvas formans. 13. X. 1910 (No. 4545).

### Cupressaceae.

**Juniperus drupacea** Labill. Mamuret-ül-Aziz: Achyr-Dar (Taurus), supra pagum Nağarli dit. Mar'as, in rupestribus alt. ca. 1000 *m.* 13. X. 1910 (No. 4546).

*J. Oxycedrus* L. Kurdist. Turc. distr. Berwari: ad colles circa pagum Mongeš in valle Sapna inter Aradên et Zacho (Azach) (ad septentriones ab oppido Môşul), alt. ca. 800—1000 *m.* 23. VI. 1910 (No. 4550), cum *Arceuthobio Oxycedri*; in valle ad pagum Nazarki dit. Amadia (cum *Arceuthobio O.*) alt. ca. 900 *m.* 28. VI. 1910 (No. 4551); distr. Ramorân: ad pagum Auwal in valle Bekât ad orientem ab oppido S'ert, alt. ca. 750 *m.* 20. VII. 1910 (No. 4498, cum *Arc. Oxyc.*). Mamuret-ül-Aziz: Achyr-Dar (Taurus), ad pagum Nağarli dit. Mar'as, alt. ca. 900 *m* (cum *Arc. Oxyc.*, No. 4553). Syria: Libanon, ad pagum Brumâna supra Beirût, alt. ca. 700 *m.* 20. X. 1909 (No. 4552).

*J. excelsa* M. B. Kurdist. Turc. distr. Hakkari: mons Kêla Mame supra pagum Hoz inter pagos Hašitha et Šattak, in declivitatibus ad meridiem spectantibus substrato calcareo alt. ca. 2000—2300 *m* frutices et arbores humiles 3—4 *m* altos formans. 28. VII. 1910 (No. 4556). In convalle torrentis Tachterçi-Su inter pagos Hoz et Šattak, ad rupes calcar. alt. ca. 1500 *m* arborea 5—8 *m* alta. 30. VII. 1910 (No. 4557). In valle fluv. Zab prope pagum Koçânes dit. Ğulamerik, alt. ca. 1400—1800 *m* arborea 3—5 *m* alta. Aput Chaldaeos „Brûwa“ vocatur. 6. IX. 1910 (No. 4556 a). Mamuret-ül-Aziz: Achyr Dar (Taurus), inter pagos Melanli et Nağarli dit. Mar'as alt. 900—1000 *m* arborea 5—8 *m* alta, cum *Cedro Libani* et *Junipero faetidissima* silvas formans. 13. X. 1910 (No. 4547). In convalle torrentis Tachterçi-Su inter pagos

Hoz et Šattak, ad rupes calcareas alt. ca. 1500 *m* arborea ca. 4—6 *m* alta. 30. VII. 1910 (No. 4557).

*J. faetidissima* Willd. Mamuret-ül-Aziz: Achyr-Dar (Taurus), inter pagos Melanli et Nağarli dit. Mar'aš alt. ca. 900—1000 *m* arborea, 5—6 *m* alta, cum *J. excelsa* et Cedro Libani silvas formans. 13. X. 1910 (No. 4554 et 4555).

*J. Phoenicea* L. Arabia Petraea: Wâdi Bustan inter Et-Tafile et Eš-Šôbak, ad rupes arenaceas frequens alt. ca. 600—800 *m*. 18. VI. 1909 (No. 4548); Ğebel Hârûn (Hor) supra Wâdi Mûsa (Petra), ad rupes arenaceas alt. ca. 700 *m*. 19. VI. 1909 (No. 4549).

**Casuarina** *equisetifolia* Forster. Palaestina: culta in hortis Hierosolymorum 21. VIII. 1909 (No. 4542). Mesopotamia: culta in cimiterio ad Bassoram Antiquam prope Bašra.

### Ephedraceae.

*Ephedra pachyclada* Boiss. (? spec. sterilia) Persia austr.: Kuh Chormûğ dit. Bušir (Abu Šehr), ad rupes calcar. supra pagum Hawize. 18. II. 1910 (No. 4539).

*E. campylopoda* C. A. Mey. Palaestina orient. (Moab): Ğebel Nebo dit. Mâdaba, ad rupes calcar. alt. ca. 700 *m*. 30. VI. 1909 (No. 4534). Syria litoralis: Râs Beirût prope Beirût, alt. ca. 20 *m*. 3. XI. 1909 (No. 4533).

*E. Alte* C. A. Mey. Judaea: Wâdi el-Kelt. inter Hierosolyma et Jericho, ad rupes calc. aridissimas alt. ca. -150 *m*. 30. III. 1909 (No. 4535 et 4536); ad monaster. St. Cosibae alt. ca. -50 *m*, 14. IV. 1909 (No. 4537). Arabia Petraea: ad pagum Elġi prope Petram (Wâdi Mûsa), 18. VI. 1909 (No. 4538). Kurdist. Turc. (Assyria): Ğebel Hamrîn inter pagos Bakûba et Kezrabad, in steppa alt. ca. 150 *m*. 2. V. 1910 (No. 4540); ad pagum Chandûk ad Tigridem infra Hassan Kef (Hisn Keifa) in steppa, alt. ca. 350 *m*. 2. VII. 1910 (No. 4541).

*E. foliata* Boiss. et Ky. Kurdist. Turc. distr. Šerizor: inter pagos Dêr Harîr et Baba Ğiğik dit. Erbil (Arbela)-Rewandûz, in steppa alt. ca. 650 *m*. 20. V. 1910 (No. 84).

### Pteridophyta.

#### Osmundaceae.

*Osmunda regalis* L. Syria litoralis, Libanon: ad fontes et in humidis ad pagum Brumâna supra Beirût, alt. ca. 700 *m*. X. 1909 (No. 1183).

#### Polypodiaceae.

*Polypodium vulgare* L. var. nova **glaucum** m. *Rhizomate paleis fuscis e basi ovata longissime attenuatis acutissimis ca. 2 mm latis et 10 mm longis densissime vestito. Petiolis brevibus, frondis*

*lamina duplo, triplo et usque pluries brevioribus, 5—1 cm longis. Laminae ambitu late ovatis 5—10 cm longis et 4.5—8 cm latis, segmentis linearibus, apice rotundatis, obtusissimis, serratis, sinus amplos formatibus, summis confluentibus, in pagina superiore atro-viridibus, in pagina inferiore multo pallidioribus, glaucis. [Polyp. vulgare L. ssp. glaucum m. in sched.].\**

Crescit in Syria boreali (Libanon): ad pagum Brumâna supra Beirût, ad rupes calcar. aridas in convallibus subumbrosis alt. ca. 750 m. Legi X. 1909 (No. 1175).

**Anogramme leptophylla** (L.) Lk. [= *Gymnogramme leptophylla* (L.) Desv.] Kurdist. Turc. distr. Şerizor: ad pagum Kân-i-Watman inter Erbil (Arbela) et Rewandûz, in fissuris rupium calcar. umbrosis alt. ca. 700 m. 21. V. 1910 (No. 1184).

**Notholaena lanuginosa** (Desf.) Desv. [= *N. vellea* Desv.] Galilaea: ad 'Ain Tabra et 'Ain Tine prope Tiberiadem, in fissuris rupium calcar. supra fontes alt. ca. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 1166 et 1167). Persia austro-occid. (Susiana): Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran), in fissuris rupium calcar. in convalle torrentis. 25. III. 1910 (No. 1165).

**Adiantum capillus Veneris** L. Judaea: Wâdi Bêt Hanîna prope Hierosolyma, in fissuris rupium calcar. alt. ca. 600 m. f. *nana aprica*. 26. III. 1909 (No. 1181); Wâdi el-Kelt inter Hierosolyma et Jericho, ad rivulum alt. ca. -100 m, forma *segmentis amplis, breviter cuneatis, obtuse parum profunde lobatis, acute serratis*. 30. III. 1909 (No. 1179). Moab: Hammâm ez-Zerka (Kallirrhoë) ad litus orient. Maris Mortui dit. Mâdaba, ad rivum calidum alt. ca. -200 m. (Forma cum forma praecedenti congruens). 27. VI. 1909 (No. 1180). Persia austr.: Kuh Chormûğ dit. Buşîr (Abu Şehr), ad fontem prope pagum Hawize. Forma *segmentis longius cuneatis, profunde lobatis, lobis anguste obovato-linearibus, obtusis, integris, lateralibus interdum denticulis paucis praeditis*. 17. II. 1910 (No. 1182).

**Cheilanthes fragrans** (L.) Webb. et Berth. In Palaestina et Syria praesertim maritima, in fissuris rupium et inter muros frequens. Judaea: Wâdi Bêt Hanîna prope Hierosolyma, alt. ca. 650 m. 26. III. 1909 (No. 1172); Wâdi Sunnâr dit. Hierosolymorum, alt. ca. 700 m. 25. III. 1909 (No. 1170). Galilaea: 'Ain Tabra prope Tiberiadem, in fissuris rupium ad fontem alt. ca. -200 m. 22. IV. 1909 (No. 1171). Persia austr.: Kuh Chormûğ dit. Buşîr (Abu Şehr), supra pagum Hawize, in fissuris rupium calc. 19. II. 1910 (No. 1168). Persia austro-occid. (Susiana): Siah-Kuh (Pušt-i-Kuh) supra Deilerûn (Deh-i-Loran), ad rupes calcar. 25. III. 1910 (No. 1169).

**Pteris longifolia** L. Phoenicia litoralis: Sa'ida (Sidon), inter rupes subhumidas ad ruinas templi alt. ca. 20 m. 28. IV. 1909 (No. 1162).

**Asplenium fissum** Kit. Persia austr.: Kuh Chormûğ dit. Buşîr (Abu

\* Tabula III. fig. 2. tabularum partis IV. praecedentis (harum publ. No. 105).



Šehr), supra pagum Hawîze, in fissuris umbrosis rupium calcar. 17. II. 1910 (No. 1173).

**Ceterach** officinarum Willd. In Palaestina et Syria praesertim maritima frequentissimum. Judaea: Wâdi Bêt Hanîna et Wâdi es-Sunnâr dit. Hierosolymorum, in fissuris rupium et ad muros alt. ca. 700 m. 25., 26. III. 1909 (No. 1163 et 1164).

**Blechnum** Spicant (L.) Sm. Syria, Libanon: ad monasterium Mâr Šâja prope pagum Brumâna dit. Beirût, ad fontem in silva Pini Halepensis alt. ca. 750 m. 26. XI. 1910 (No. 1161).

**Nephrodium** Thelypteris (L.) Desv. Mamuret-ül-Aziz (Taurus): in lacu Göl-Başı prope pagum Inatli inter Malatîa et Mar'as alt. ca. 1000 m, ad ripam cum Phragmite et Nuphari luteo frequentissimum. 12. X. 1910 (No. 1174).




Fig. 15.

*Equisetum ramosissimum* Desf. var. *Oriente* Nk. ca.  $\frac{8}{1}$ .

Del. Dr. Fr. Nábělek.

**Cystopteris fragilis** (L.) Bernh. Kurdist. Turc. distr. Hakkîari: in pratis alpinis humidis supra pagum Haşîtha dit. Ğulamerik, alt. ca. 1650 *m* et in monte Dwile supra Haşîtha, ad rupes humidias, alt. ca. 1900 *m*. 18. VI. 1910 (No. 1777 et 1778). Ğelo-Dar dit. Ğulamerik: ad tentoria aestiva Djezra, in pratis alpinis humidis alt. ca. 2800 *m*. 3. IX. 1910 (No. 1176).

### Equisetaceae.

**Equisetum ramosissimum** Desf. var. **orientale** m. [Pag. 38, fig. 15] inter variationes bi-multilineatas Milde [Monographia Equisetorum pag. 439] pertinens. *Caulis plerumque elatus, 1—2.5 m altus, glaucus, scabridus, ramosus, 15—25-angulus (forma ramosa), rarius caules plures caespitosi, simplices ca. 25—30 cm alti (forma caespitosa). Vaginae infimae atro-fuscae, ceterae concolores, ca. 10 mm longae, cylindricae, ore solum paulo dilatatae, dentibus basi albidis, latiuscule albo-marginatis, apice nigris, nitentibus, e basi triangulata longissime subulato-acuminatis, membranaceis, fragilibus, usque 4 mm longis, coronatae. Rami 4—7, verticillati, 15—30 cm longi, 8-anguli, tenues, scabri, saepe fructiferi, vaginas ca. 5 mm longas, apice subdilatatas et ideo subturbinatas, concolores, gerentes. Spicae flavae, cylindrico-oblongae, acutiusculae, ad caulem terminales usque 2 cm longae et ca. 6 mm latae, ad ramos 10—12 mm longae et 3—4 mm latae, vagina turbinata ore et dentibus albidis, dentibus ad basin solum puncto atro ornatis, suffultae. Stomatum lineae in valleculis binae, cellulis 4—5 disiunctae.*

Palaestina borealis: ad Tell-el-Kađi dit. Bânias (Caesarea Philippi), ad fontem Jordanis inter frutices alt. ca. 250 *m* forma ramosissima, elata. 25. VI. 1909 (No. 1157). Kurdist. Turc. distr. Ramorân: inter pagos Hadîde et Godianos ad orientem ab oppido S'ert, in silvula salicum ad rivum alt. ca. 600 *m* f. ramosa. 17. VII. 1910 (No. 1160). Kurdist. Turc. distr. Şerizor: traiectus Serderrian prope Rewandûz dit. Erbil (Arbela), ad fontem alt. ca. 1000 *m* f. caespitosa, vaginarum dentibus tota fere longitudine nigris. 24. V. 1910 (No. 1159). Kurdist. Turc. distr. Berwari: ad rivum prope pagum 'Ain Nûne inter Amadia et Haşîtha alt. ca. 1100 *m* forma caespitosa. 16. VI. 1910 (No. 1158).

### Selaginellaceae.

**Selaginella denticulata** (L.) Link. Syria, Libanon: ad pagum Brumâna supra Beirût, in fissuris rupium calcar. subhumidis alt. ca. 700 *m*. X. 1909 (No. 1185).

## Addenda.

Cruciferae: **Drabella** thylacocarpa Nábělek genus et spec. nova e Kurdistan. Turc. distr. Hakkari, cf. Acta Botanica Bohemica Vol. III. (1924) p. 32—34.

Gentianeae: **Gentiana** aurea L. (Tab. IV., fig. 5\*) forma *nana*, floribus sordide caeruleis, praesertim basalibus longe pedicellatis, pedicellis




Fig. 16.

Del. Dr. Fr. Nábělek.

*Gentiana aurea* L. 1 Flos, 2, 3 capsula, 4 calyx, 5 calycis laciniae apex, 6 corolla.

*tenuibus, flores longitudine usque triplo superantibus, superioribus breviter pedicellatis. Specimina praemorsa floribus omnibus longe pedicellatis. Taurus Armenus: traiectus Čuk inter pagos Chôšab et Baškala dit. Wan, in pratis alpinis humidis alt. ca. 2300 m. 30. VIII. 1910 (No. 2744).*

---

\* Tabularum partis IV. (harum publ. No. 105).



## Index generum partis V.

Adiantum 37	Cutandia 21	Osmunda 36
Aegilops 29	Cynodon 12	Panicum 3
Aeluropus 18	Cynosurus 13	Pappophorum 12
Agropyrum 23	Cystopteris 38	Pennisetum 3
Agrostis 7	Dactylis 18	Pentatherum 8
Alopecurus 6	Digitaria 3	Phalaris 5
Ammophila 10	Echinochloa 3	Phleum 6
Anatherum 10	Elymus 34	Phragmites 13
Andropogon 4	Ephedra 36	Pinus 35
Anogramme 37	Equisetum 39	Poa 19
Anthistiria 4	Eragrostis 17	Polypodium 36
Aristida 6	Erianthus 4	Polypogon 8
Arrhenatherum 10	Festuca 20	Pteris 37
Asplenium 37	Heteranthelium 27	Saccharum 4
Avena 10	Hordeum 31	Schismus 19
Blechnum 38	Imperata 4	Sclerochloa 20
Boissiera 13	Juniperus 35	Scleropoa 21
Brachypodium 23	Koeleria 14	Secale 27
Briza 17	Lamarckia 13	Selaginella 39
Bromus 21	Lolium 31	Setaria 3
Calamagrostis 8	Melica 17	Sorghum 4
Casuarina 36	Milium 7	Sphenopus 17
Catabrosa 17	Nardurus 20	Spodiopogon 4
Cedrus 35	Nephrodium 38	Stipa 6
Ceterach 38	Notholaena 37	Tetrapogon 12
Cheilanthes 37	Oryza 5	Trisetum 10
Chrysopogon 4	Oryzopsis 7	Triticum 27
Cornucopiae 6		Vulpia 20

---

## Index familiarum.

Acanthaceae III. 38	Araliaceae I. 130	Chenopodiaceae IV. 8
Aizoaceae I. 116	Aristolochiaceae IV. 16	Cistineae I. 36
Alismaceae IV. 25	Asclepiadaceae III. 11	Colchicaceae IV. 29
Alsineae I. 47	Asparagaceae IV. 41	Compositae II.
Amarantaceae IV. 11.	Berberidaceae I. 18	Convolvulaceae III. 13
Amaryllidaceae IV. 29	Borragineae III. 15	Cornaceae I. 130
Ampelideae I. 62	Campanulaceae III. 3	Crassulaceae I. 117
Anacardiaceae I. 63	Capparidaceae I. 34	Cruciferae I. 25
Apocynae III. 10	Caprifoliaceae I. 130	Cucurbitaceae I. 115
Araceae IV. 25	Ceratophyllaceae I. 51	Cupressaceae V. 35

Cupuliferae IV. 21  
 Cyperaceae IV. 43  
 Cytinaceae IV. 16  
 Dioscoreaceae IV. 41  
 Dipsacaceae I. 138  
 Elaeagnaceae IV. 15  
 Ephedraceae V. 36  
 Equisetaceae V. 39  
 Ericaceae III. 9  
 Euphorbiaceae IV. 16  
 Frankeniaceae I. 52  
 Fumariaceae I. 23  
 Gentianeae III. 12  
 Geraniaceae I. 57  
 Globulariaceae III. 29  
 Gramineae V. 3  
 Granateae I. 113  
 Gymnospermae V. 35  
 Halorrhogidaceae I. 115  
 Hydrocharitaceae IV. 25  
 Hypericineae I. 52  
 Iridaceae IV. 28  
 Juglandaceae IV. 21  
 Juncaceae IV. 41  
 Labiatae III. 40  
 Laurineae IV. 15  
 Leguminosae I. 65  
 Liliaceae IV. 30  
 Lineae I. 56  
 Lorantaceae IV. 15

Lythraceae I. 113  
 Malvaceae I. 53  
 Meliaceae I. 62  
 Mollugineae I. 50  
 Monocotyledoneae IV. 25  
 Moringeae I. 65  
 Myrtaceae I. 112  
 Nyctaginaceae IV. 14  
 Nymphaeaceae I. 18  
 Oenotheraceae I. 113  
 Oleaceae III. 10  
 Onagrarieae I. 113  
 Orchideae IV. 26  
 Orobanchaceae III. 37  
 Osmundaceae V. 36  
 Oxalideae I. 57  
 Papaveraceae I. 19  
 Paronychieae I. 49  
 Pinaceae V. 35  
 Plantagineae IV. 4  
 Platanaceae IV. 21  
 Plumbagineae IV. 3  
 Polygaleae I. 38  
 Polygoneae IV. 12  
 Polypodiaceae V. 36  
 Portulacaceae I. 50  
 Potamogetonaceae IV. 25  
 Primulaceae III. 9  
 Pteridophyta V. 36

Ranunculaceae I. 13  
 Resedaceae I. 35  
 Rhamnaceae I. 63  
 Rosaceae I. 103  
 Rubiaceae I. 131  
 Rutaceae I. 61  
 Salicaceae IV. 24  
 Salsolaceae IV. 8  
 Salvadoraceae III. 10  
 Santalaceae IV. 15  
 Sapindaceae I. 62  
 Saxifragaceae I. 118  
 Scrophulariaceae III. 26  
 Selaginellaceae V. 39  
 Sesameae III. 13  
 Sileneae I. 38  
 Simarubeae I. 62  
 Smilaceae IV. 41  
 Solanaceae III. 25  
 Sterculiaceae I. 55  
 Styracaceae III. 10  
 Tamariscineae I. 51  
 Thymelaeaceae IV. 14  
 Typhaceae IV. 26  
 Umbelliferae I. 118  
 Urticaceae IV. 20  
 Valerianeae I. 137  
 Verbenaceae III. 39  
 Violarieae I. 38  
 Zygophyllaceae I. 59



Photogr. Dr. Fr. Nábělek.

1. *Anatherum tauricum* Nk. 2. *Acantholimon Assyriacum* Boiss. var. *micracme* Nk.  
et Bornm. 3. *Pentatherum Olympicum* (Boiss.) Nk. var. *nivale* Nk.








Photogr. Dr. Fr. Nábělek.

1 *Agropyrum campestre* Gr. et Godr. var. *Warakense* Nk. 2 *Carex distans* L. f. *longibracteata* m. 3 *Agropyrum Košanini* Nk.







Photogr. Dr. Fr. Nábělek.

1 *Aegilops Aucheri* Boiss. var. *Schulzii* Nk. 2 *Koeleria Domini* Nk. 3 *Agropyrum Podpěrae* Nk.





1 *Bromus tomentellus* Boiss. var. *Tauricolus* Nk. 2 *Juncus bufonius* L. var. *Susianus* Nk. 3 *Hordeum spontaneum* K. Koch *a* var. *Ithaburenses* (Boiss.) Nk., *b* var. *schnatherum* (Cosson) Thell., *c* var. *Proskowetzii* Nk. 4. *Allium thrichocephalum* Nk.

Photogr. Dr. Fr. Nábělek.







Aeluropus mesopotamicus Nk. 1 Habit, 2 folia, 3 glumella, 4 palea, 5 ovary, 6 stamen, 7 pistil. Photograph. Dr. Fr. Nábělek. 1, 2 ca.  $\frac{1}{11}$ , 3—5 ca.  $\frac{10}{1}$ .







101. J. PODPĚRA: Quod momentum significet Carex pediformis in stepposis silvaticis Europae mediae. (22 p.)
102. G. ŠIRJAEV: Generis Trigonella L. revisio critica I. (58 p.)
103. J. V. DUBSKÝ a FR. BRYCHTA: Příspěvek ke studiu komplexních solí dimethylglyoximu. (Contribution à l'étude combinaisons complexes de la dimethylglyoxime.) (28 p.)
104. J. KAUCKÝ: Sur une classe de surfaces. (22 p.)
105. FR. NÁBĚLEK: Iter Turcico-Persicum. Pars IV: Plantarum collectarum enumeratio. (Plumbagineae-Cyperaceae.) (52 p.)
106. O. BORŮVKA: Sur une classe de surfaces minima plongées dans un espace à cinq dimensions à courbure constante. (28 p.)
107. L. SEIFERT: Sur les surfaces du troisième degré qui ont, aux points d'une courbe plane, un contact d'ordre deux avec une surface générale. (17 p.)
108. V. ČUPR: Nový typ thermostatů. (A new type of thermostat.) (8 p.)
109. J. KAUCKÝ: Etude de surfaces dont une droite canonique passe par un point fixe. (37 p.)
110. G. ŠIRJAEV: Generis Trigonella L. revisio critica II. (37 p.)
111. F. NÁBĚLEK: Iter Turcico-Persicum. Pars V: Plantarum collectarum enumeratio (Gramineae-Gryptogamae). (40 p.)

Seznam sešitů 1—100 zašle na požádání Přírodovědecká fakulta  
(Brno, Kounicova 63).

Pour le catalogue des fascicules 1—100 s'adresser à la Faculté des Sciences  
(Brno, Kounicova 63).